

Э. Б. АКОПЯН, Л. У. НАЗАРОВ, А. А. БАГДАСАРЯН,
А. Р. БАЗИЯН, Э. В. МАНУКЯН

ЛЕЧЕНИЕ АНАЛЬНЫХ ТРЕЩИН С ПРИМЕНЕНИЕМ КЛЕЕВЫХ И ПОЛИМЕРНЫХ КОМПОЗИЦИЙ

Разработан новый способ лечения анальных трещин с использованием препарата этаден, медицинского клея МК-6 и полимерной пленки «Диплен». В эксперименте на 112 кроликах изучена динамика репаративных процессов в ране слизистой анального канала под воздействием указанных препаратов как в отдельности, так и комплекса их в целом. Установлено, что комплексное применение этадена, медицинского клея МК-6 и полимерной пленки «Диплен» препятствует инфицированию раны и ускоряет ее заживление.

Способ применен у 73 больных с острыми и у 114—хроническими трещинами заднего прохода. Осложнения и рецидивы в непосредственные и ближайшие сроки лечения не наблюдались. Отдаленные результаты (до 3 лет) прослежены у 173 пациентов (79,7%). Рецидив возник в 4 случаях (2,3%).

9 с., ил. 4, библи. 6 назв.

НИИ проктологии МЗ АрмССР

Рукопись депон. в ВНИИМИ за № Д-18666 от 20/IX 1989 г.

Поступила 8/II 1989 г.

УДК 615.22:616.12—008.331.1

Е. Т. ГНЕУШЕВ, А. Б. КАЗАРЯН, И. А. ГНЕУШЕВА

ФАРМАКОКИНЕТИКА АЦЕБУТОЛОЛА У БОЛЬНЫХ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПРИ ОДНОКРАТНОМ И КУРСОВОМ НАЗНАЧЕНИИ «Sectral-400» ВНУТРЬ

У 12 больных с гипертонической болезнью, подверженной клинико-биохимическими исследованиями, была изучена фармакокинетика ацебутолола после однократного и курсового назначения «Sectral-400» (по 400 мг через каждые 12 часов). Кровь для определения концентрации препарата забирали спустя 1, 2, 3, 4, 6, 8 и 12 часов после однократного назначения и перед утренней дозой препарата на 2, 4, 5 и 10-е сутки при курсовом назначении.

Отмечались реципрокные отношения концентраций ацебутолола и диацетолола в крови в фазах абсорбции и выведения препарата: в фазе абсорбции преобладал ацебутолол, а в фазе выведения—диацетолол. Это связано, по всей видимости, с меньшим клиренсом диацетолола из крови по сравнению с ацебутололом. Выявлено также абсолютное увеличение концентрации диацетолола в крови больных на фоне курсового лечения и относительно постоянное значение сум-