

антибиотика в дозе 1500 мг/м^3 аэрозольной камеры на фоне иммунизации эритроцитами барана.

Установлено, что антибиотик в организме распределяется и связывается неравномерно. Наибольшее количество гентамицина обнаружено в легких через час ($60,1 \pm 4,4 \text{ мкг/г}$), а наименьшее — в тот же срок в селезенке ($0,51 \pm 0,04 \text{ мкг/г}$). Связывание препарата зависело как от органа и ткани, так и от времени исследования. Наибольший процент связанного гентамицина устанавливался в органах лимфоидной системы за исключением тимуса. Количество выводимого препарата с мочой находилось в обратной зависимости от процессов комплексообразования в почках. Антибиотик обнаруживался в организме (легкие) в течение 216 часов.

с. 8, библ. 4 назв.

Ереванский зооветеринарный институт

Рукопись депон. за № 17081 В90 от 2/IV 1990 г.

Поступила 12/V 1989 г.

УДК 613.816

Б. О. АНДЖЕЛЯН

ОПЫТ РАБОТЫ ПО АНТИАЛКОГОЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ В АРМЕНИИ

По данным, полученным нами, установлено, что в Армении из общего числа страдающих алкоголизмом и алкогольными психозами в 1984 и 1985 гг. алкогольные психозы составляли соответственно 2,1 и 1,9%. Отмечено также, что удельный вес женщин в общем числе больных алкоголизмом составлял всего 2,4% в 1984 г. и 2,3% в 1985 г. Показано, что в антиалкогольном воспитании важную роль играют медицинская деонтология, применение аутотренинга и санитарно-просветительская работа.

с. 6, библ. 16 назв.

Ереванский педагогический институт им. В. Брюсова

Рукопись депонирована в ВНИИМИ за № Д-19446 от 29/III 1990 г.

Поступила 5/IV 1989г.

УДК 616.155.37:616.35

М. А. СААКЯН, О. Я. ДАВТЯН, Н. Л. ЭКИМЯН, А. А. АКОПЯН,
К. А. САРКИСЯН, А. С. АГАБАЛЯН

МОЛЕКУЛЫ СРЕДНЕЙ МАССЫ КАК ФАКТОР ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКСИКАЦИИ ПРИ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ТОЛСТОЙ КИШКИ

Изучено значение уровня молекул средней массы в оценке выраженности эндогенной интоксикации у больных с функциональными и воспалительными заболеваниями толстой кишки. Динамическое наблюдение показало, что уровень молекул средней массы может слу-