

фосфатазной активности нейтрофилов крови и костного мозга; увеличение мегакариоцитов в миелограмме.

Отмеченные изменения, вероятно, обусловлены не только дефицитом кальция, но и определенными морфологическими сдвигами в костной ткани.

Поступила 9/І 1991 г.

6 с., илл. 6, библиогр. 12 назв.

Ереванский медицинский институт

Полный текст статьи депонирован в ВНИИТИ за № 3350-В 90 от 13.06.90 г.

УДК 616.988—056.3

А. Г. Мутафян, С. С. Гамбаров, Р. М. Минасян

НЕКОТОРЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КЛЕТОЧНО-ГУМОРАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА НОВОРОЖДЕННЫХ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ХАРАКТЕРА ТЕЧЕНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ ГОРМОНАЛЬНОГО КРИЗА

Проведено исследование клеточно-гуморального иммунитета у новорожденных в зависимости от характера течения беременности и проявлений гормонального криза.

Полученные результаты выявили изменения Т-системы иммунитета у новорожденных от матерей с тяжелыми токсикозами беременных. В то же время новорожденные с проявлениями гормонального криза имели лучшие показатели исследуемых факторов иммунитета по сравнению с новорожденными при отсутствии гормонального криза.

Исследования подобного характера заостряют внимание неонатологов на детях от матерей с поздними токсикозами, выделяя их в группу риска по развитию инфекционных заболеваний.

Поступила 20/ХІ 1991 г.

4 с., библиограф. 8 назв.

Институт акушерства и гинекологии Республики Армения

Рукопись депонирована в ВНИИТИ за Д-21137 от 21.03.91 г.