

АНДРЕИ ФЕДОРОВ

О новом виде груши (*Pirus L.*) из Армении  
Andrej Fedorov.

De nova specie generis *Piri* ex Armenia potula

Среди бесчисленного количества переходных форм, из которых складываются мосты между видами, мы видим определенные узловые сгущения с характерным набором признаков, заставляющие проводить границы в море переходов и захождений, выделяя типы, как определенные морфологические вехи, и придавая им значение видов. Таким образом, между видами, ясно выявляющими свою самостоятельность на периферии ареала рода, в центрах разнообразия, — в данном случае в переднеазиатском центре, — обнаруживаются типовые комплексы среди массы переходов, обусловленных видообразованием *in statu nascendi*.

В ряду форм, связывающих морфологически далекие груши из циклов *Salicifoliae* и *Communis*, в области их формового шахмат'а в Армении нами установлен новый вид, являющийся связующим звеном между видами *P. communis* и *P. salicifolia*. Мы отбрасываем гибридную гипотезу, недоказательную без экспериментальной проверки, считая вполне возможным допустить существование *species intermediae* без всякой гибридизации и объясняя наличие таковых явлением захождения признаков в слабо дифференцированных видовых комплексах в центрах разнообразия. В областях, удаленных от центров формового разнообразия, например в Дагестане и Шемахе, между видами *P. salicifolia* и *P. communis* не наблюдается никаких переходов, между тем возможности гибридизации и в Армении и здесь вполне одинаковы.



*Pinus Takhtadzhianii* sp. n.



*Pirus Takhtadzhianit m. sp. nova.* Arbor mediocri-  
ris rami ramulique inermes vel paucè spinosi, cortice obscure  
cinerea tecti. Folia eiusdem rami diversa, obovata, rhombea et  
elliptica, apice acuta vel obtusa, basi cuneata, margine inaequa-  
lia serrata vel crenulata, subtus margineque et praecipue ad  
costas medias ac laterales incano-tomentella, in petiolum lon-  
gum manifeste abeuntia. Petioli plerumque laminae breviores  
incano-tomentelli. Flores adhuc ignoti. Fructus maiusculus pi-  
riformi-obovatus, succosus, glaber, flavo-brunnescens. Pedun-  
culus crassus basi apiceque clavatus pomi longitudine vel  
longior.

Species in characteribus specificis intermedia inter *P. sa-  
licifoliam* et *P. communem*, attamen a priore bene differt fo-  
liis manifeste petiolatis obovatis latioribusque supra glabris  
et fructibus majoribus, a posteriore diversa foliis subtus incano-  
tomentellis basi manifeste cuneatis et rhombeis petiolisque to-  
mentosus.

Habitat ad margines silvarum frondosarum in districtu  
Vedy prope pagum Khosrov Armeniae australis, ubi 13 IX. 36  
ab amiciss. Armen Takhtadzhian lecta.

Typus in herb. Inst. Biol. Acad. Scient. U. R. S. S. in  
Erevan conservatur.

Nomen specificum dedi in honorem amiciss. Armen Takh-  
tadzhian, investigatoris florum Armeniae.

---