

РЕФЕРАТЫ

Р. Т. ДЖРБАШЯН, Ю. А. МАРТИРОСЯН, Р. Н. ТАЯН

О ВЫЯВЛЕНИИ ОТЛОЖЕНИЙ ДАТСКОГО ЯРУСА В ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ ЗОНЫ ГИРАТАХСКОГО РАЗЛОМА

Терригенно-карбонатные отложения юго-восточной части зоны Гиратахского разлома к настоящему времени фаунистически не охарактеризованы. В многочисленных работах по геологии региона, а также на имеющихся картах различного масштаба описываемые отложения относились к палеозою или верхнему мелу.

В настоящее время в водораздельной части Мегринского хребта, в седловине между двумя вершинами горы Гомаранц, в верхах пачки глинистых известняков с падением на северо-восток  $50^\circ$  под углом  $50—60^\circ$  установлена обильная фауна фораминифер: *Globigerina varianta* Subbotina, *Globigerina triloculinoides* Plummer, *Globigerina pseudobuloides* Plummer, *Acarinina inconstans* Subbotina, *Anomalina ex gr. danica* (Brotzen) (определения Ю. А. Мартirosян).

Приведенный комплекс микрофауны позволяет довольно определенно датировать рассматриваемые терригенно-карбонатные отложения верхами датского яруса.

Отложения датского яруса на Малом Кавказе часто проявляются совместно с отложениями палеоцена и объединяются с ними в единый стратиграфический комплекс.

Имеющийся в нашем распоряжении фактический материал позволяет, по-видимому, более обоснованно говорить о наличии в регионе даний-палеоценовых отложений, условно выделенных ранее А. А. Беловым к северу в Шишкертском разрезе.

Основываясь на вышеизложенном и на региональных геологических сопоставлениях, в настоящее время можно предполагать значительно более широкое распространение даний-палеоценовых отложений в южном Закавказье, вдоль всей зоны Гиратахского разлома.

Институт геологических наук  
АН Армянской ССР

Поступила 26.IV.1977.