ГЕТЕРОЦЕПНАЯ СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ*

VI. СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ НЕКОТОРЫХ НЕВИНИЛОВЫХ МОНОМЕРОВ
 СО СТИРОЛОМ И ХЛОРОПРЕНОМ

А. А. ДУРГАРЯН и А. С. ГРИГОРЯН

Исследована сополимеризация эпихлоргидрина со стиролом в присутствии изо-пропилата алюминия и четыреххлористого олова. В случае первого катализатора активным мономером является стирол, а в случае последнего—эпихлоргидрин. Окись этилена со стиролом под действием изопропилата алюминия дает полиокись этилена, а с хлоропреном под действием хлористого алюминия—сополимер. Найдено, что окись этилена активнее хлоропрена. Стирол с ацето- и бензонитрилами под дей-ствием разных катализаторов образует полистирол. Рассчитаны константы сополи-меризации.

Исследована сополимеризация эпоксидов с нитрилами и найдено, что нитрилы в большинстве случаев менее активны, чем эпихлоргид-рин и окись этилена [1, 2, 3]. Интересно было выяснить поведение этих мономеров при сополимеризации с виниловыми и диеновыми мономерами.

В данной статье приведены результаты исследования сополиме-ризации эпихлоргидрина (ЭХГ), окиси этилена (ОЭ), ацето- (АцН) и бензонитрилов (БН) со стиролом и ОЭ с хлоропреном (ХП). Данные по сополимеризации стиrolа с ОЭ, ЭХГ, АцН и БН приведены в таблицах 1, 2, 3 соответственно.

Таблица 1

Сополимеризация стиrolа с ОЭ при комнатной температуре (20°)
 в присутствии изопропилата алюминия (2 мол. %)

Мол. доля стирола в исх. смеси	Продолжитель- ность реакции, часы	% превра- щения	Анализ полимера, %	
			С	Н
0,34	48	14,5	55,13	9,28
0,50	20	0,8	53,70	9,30
0,50**	9,5	6,0	53,80	9,00
0,60	48	—	54,73	9,30
0,80	48	8,8	53,69	9,00
0,75	120	3,8	54,37	8,80
0,90	120	1,00	53,80	8,80

* Предыдущее сообщение см. [3].

** Температура реакции 70°С.

Таблица 2

Сополимеризация стирола с ЭХГ в присутствии изопропилата алюминия (1 мол. %), при 70°C

Мол. доля ЭХГ в исх. смеси	Продолжительность реакции, часы	α , % превращения	Содержание хлора в сополимере, %	Мол. доля ЭХГ в сополимере
0,20	20,5	4,72	1,72; 1,75	0,05*
0,28	11	1,7	2,25; 2,27	0,07
0,35	20	3,1	1,80; 2,00	0,06
0,50	27	11,2	2,37	0,07
0,50	—	7,0	2,27; 2,17	0,07
0,65	14	1,6	5,92; 5,95	0,17
0,80	34	1,9	6,57; 6,64	0,20
0,95	24	0,5	15,74	0,44

* $[\eta]$ (мл/г) = 145 в бензоле при 30°.

Из приведенных данных следует, что стирол сополимеризуется с ЭХГ под действием изопропилата алюминия при 70°, а с остальными мономерами практически не сополимеризуется. Интересен тот факт, что под действием изопропилата алюминия нитрилы сополимеризуются с ОЭ [2]; ОЭ намного активнее стирола и получается чистый гомополимер ОЭ, а в случае сополимеризации нитрилов со стиролом последний более активен и получается почти чистый полистирол. Имея ввиду нуклеофильность нитрилов кажется мало вероятной их инертность в отношении карбкатиона; поэтому, вероятно, происходит присоединение нитрила к концу цепи с карбкатионом стирола; однако при реакции со стиролом протекает не присоединение стирола к концу цепи, а замещение нитрила стиролом [5] вследствие чего получается полистирол.

Вышеприведенные данные указывают на то, что как и в случае радикальной сополимеризации, построить ряд активностей мономеров невозможно.

Получение сополимера, а не смеси полимеров при сополимеризации стирола с ЭХГ доказывается тем, что в качестве осадителя использован метанол, в котором растворяется полиЭХГ; кроме того, поставлены холостые опыты для проверки получения полимера в отсутствие катализатора (радикальная полимеризация). В холостых опытах полимер не образовался. Определено $[\eta]$ одного сополимера при 30° в бензоле—145. Если использовать константы зависимости $[\eta]$ от молекулярного веса полистирола [6], то получается $M_n = 4,3 \cdot 10^5$, что исключает возможность вхождения ЭХГ в полимер в качестве концевых групп.

Таблица 3

Сополимеризация стирола с АцН и БН

Мол. доля нитрила в исх. смеси	Катализатор, мол. %	Температура реакции, °С	% превращения	Содержание азота в полимере, %
Ацетонитрил				
0,50	Al(OC ₂ H ₇ -изо)	70	66,5	0,40
0,50	SnCl ₄	20	53,7	0,48
0,80	AlCl ₃	20	19,0	0,20
Бензонитрил				
0,50	AlCl ₃	70	5,8	0,48
0,50	AlCl ₃	20	38,4	0,45
0,80	AlCl ₃	20	11,8	0,20
0,50	SnCl ₄	20	33,4	0,41
0,80	SnCl ₄	20	8,1	0,35

Согласно данным таблицы 2 с использованием уравнения Майо и Льюиса [1] методом пересечения прямых определены константы сополимеризации $r_1 = 8,9 \pm 0,6$, $r_2 = -0,1 \pm 0,1$. Получение r_2 со знаком минус можно рассматривать как довод в пользу того, что эти данные не описываются уравнением Майо и Льюиса, т. е. механизм сополимеризации отклоняется от схемы, согласно которой выведено вышеуказанное уравнение. Поскольку рассмотрение свойств онневых соединений привело к выводу, что при катионной сополимеризации всегда возможны реакции замещения, то более правильным является использование уравнения, учитывающего протекание этих реакций [5]. Нами использовано самое простое из этих уравнений, не учитывающее влияние предыдущих групп и выведенное принятием следующей схемы:

$$\frac{d[M_1]}{d[M_2]} = \gamma S \frac{r_1 S + 1}{r_2 + S} \quad \text{где} \quad \gamma = \frac{1 + \frac{K'_{21}}{K_{21}}}{1 + \frac{K'_{12}}{K_{12}}}$$

$$r_1 = \frac{K_{11}}{K_{12}}; \quad r_2 = \frac{K_{22}}{K_{21}}; \quad S = \frac{[M_1]}{[M_2]}$$

Использованием трех данных вышеуказанной зависимости состава сополимера от состава исходной смеси определены константы $\gamma = 3,6$, $r_1 = 2,5$, $r_2 = 0,115$. Эти значения констант показывают, что при сополимеризации ЭХГ со стиролом в присутствии изопропилата алюминия стирол (M_1) более активен, чем ЭХГ, что отношение скорости реакции замещения единицы ЭХГ в конце растущей цепи молекулой стирола к скорости присоединения стирола к концу этой же цепи больше отношения скоростей аналогичных реакций ЭХГ со стирольными концевыми группами активных центров. Если стирол в конце цепи не замещается ЭХГ, т. е. $K_{12}^* = 0$, тогда скорость реакции

Рис. Зависимость состава сополимера от состава исходной смеси при сополимеризации: 1. хлоропрена с ОЭ (AlCl_3), 2. стирола с ЭХГ ($\text{Al}(\text{OC}_3\text{H}_7\text{-изо})_3$). Кривая а) рассчитана с использованием уравнения Майо и Льюиса, кривая б) — с использованием уравнения приведенного в статье.

алюминия (см. рис.). Эти данные удовлетворительно описываются уравнением Майо и Льюиса [4] при $r = 3,0$, $r_2 = 0,3$. Это указывает на то, что ОЭ почти в три раза активнее хлоропрена в данных условиях, независимо от природы концевой группы растущей цепи. Получение сополимера, а не смеси полимеров доказывается тем, что полимер осажден метанолом, в котором растворяется поли-ОЭ. Полученный полимер промывали водой; в воде не было полимера, а элементарный состав полимера после промывки не изменился. Возможность протекания отдельной полимеризации хлоропрена проверялась холостым опытом.

На рисунке экспериментальные данные сопоставлены с теоретически рассчитанными кривыми.

замещения единицы ЭХГ в конце растущей цепи стирола в 2,6 раза больше скорости присоединения стирола к концу этой цепи.

В связи с вышесказанным интересен тот факт, что при сополимеризации этой пары мономеров в присутствии четыреххлористого олова происходит резкое изменение активностей мономеров и ЭХГ становится намного активнее стирола. Так, при сополимеризации смесей мономеров, содержащих 25 и 75 мол. % ЭХГ, в сополимерах его содержание оказалось соответственно равным 72 и 97 мол. %.

Нами сополимеризована также ОЭ (M_1) с хлоропреном в присутствии хлористого

Экспериментальная часть

Получение и очистка ЭХГ и нитрилов и использованные катализаторы описаны в работах [1, 2]. Стирол промыт 10%-ным едким натром, дистиллированной водой, высушен хлористым кальцием, перегнан в токе азота в вакууме, высушен сульфатом кальция и еще раз перегнан в колбу с отверстием для отбора стирола шприцом. Хлоропрен высушен хлористым кальцием и перегнан несколько раз в токе азота из колбы с дефлегматором.

Сополимеризация хлоропрена с ОЭ проведена при 20°C. Реагенты помещены в ампулы шприцом в токе азота. Кроме катализатора прибавлен 0,01 мол. % гидрохинона. Сополимер растворен в дихлорэтане, после удаления катализатора осаждением осажден метанолом и затем переосажден трижды. Он образует очень вязкие растворы.

Сополимеризация со стиролом проведена аналогичным образом без прибавления гидрохинона. В качестве растворителя использован бензол, а как осадитель—метанол или петролейный эфир (в случае окиси этилена). Катализаторы удалены осаждением [1, 2]. Во всех случаях поставлены холостые опыты.

Ереванский государственный
университет

Поступило 25 VII 1966

ՀԵՏԵՐՈՇՂԹԱՅԱԿԱՆ ՀԱՄԱՏԵՂ ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՈՒՄ

VI. ՄԻ ՔԱՆԻ ՈՉ ՎԻՆԿԱՅԻՆ ՄՈՆՈՄԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՂ ՊՈԼԻՄԵՐԱՑՈՒՄ
ՍՏԻՐՈԼԻ ԵՎ ՔԼՈՐԱՊՐԵՆԻ ՀԵՏ

Ա. Հ. ԳՈՐԳԱՐՅԱՆ և Ա. Ս. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Հետազոտված է ալլումինիումի իզոպրոպիլատի ազդեցության տակ ստիրոլի (M_1) և էպիքլորհիդրինի համատեղ պոլիմերացումը 70°-ում: Որոշված են համատեղ պոլիմերացման հաստատունները $\gamma=3,6$, $r_1=2,5$, $r_2=0,115$ և մածուցիկության սահմանափակ թիվը $[\eta] \frac{d[\eta]}{dQ} = 1,45$: Նույն մոնոմերներն անագի

տետրաէլորիդով համատեղ պոլիմերելիս էպիքլորհիդրինը ստիրոլից ակտիվ է: Էթիլենի օքսիդը ստիրոլի հետ 20 և 70°-ում ալլումինիումի իզոպրոպիլատի ազդեցության տակ տալիս է պոլիէթիլենգլիկոլ: Ստիրոլը ացետա-և բենզոնիտրիլների հետ ալլումինիումի իզոպրոպիլատի, անագի քլորիդի և ալլումինիումի քլորիդի ազդեցության տակ տալիս է համարյա մաքուր պոլիստիրոլ: Ալլումինիումի քլորիդի ազդեցության տակ ստացված է էթիլենի օքսիդի հետ քլորապրենի (M_2) համատեղ պոլիմերը, որոշված են համատեղ պոլիմերացման հաստատունները $r_1=3,0$ և $r_2=0,3$:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. А. А. Дургарян, Р. М. Бегинян, *Высокомолекулярное соединение*, 5, 28 (1963); *Изв. АН АрмССР ХН*, 18, 139 (1965).
2. А. А. Дургарян, Р. А. Аракелян, *Высокомолекулярное соединение*, 8, 1321 (1966).
3. А. А. Дургарян, Р. А. Аракелян, *Высокомолекулярное соединение*, 9А, 91 (1967).
4. F. R. Mayo, F. M. Lewis, *J. Am. Chem. Soc.*, 66, 1594 (1944).
5. А. А. Дургарян, *Высокомолекулярное соединение*, 9А, 2330 (1967).
6. С. Р. Рафиков, С. А. Павлова, И. И. Твердохлебова, «Методы определения молекулярных весов и полидисперсности высокомолекулярных соединений», АН СССР, Москва, 1963 г., стр. 323.