СИНТЕЗЫ НА ОСНОВЕ 4-АЛКОКСИБЕНЗИЛГИДРАЗИНОВ

А. А. АРОЯН и Н. С. ИРАДЯН

Институт тонкой органической химии АН Армянской ССР (Ереван)

Поступило 15 VII 1970

Исследована реакция 4-алкоксибвзилхлоридов с гидразином. Полученные 4-алкоксибензилгидразины использованы в синтезе замещенных тиосемикарбазидов, гидразонов и аминогуанидинов—соединений с потенциальной антибактериальной активностью. Осуществлен синтез N-замещенных гидразидов триметилуксусной кислоты и ряда производных пиразолона.

Табл. 6, библиограф. ссылки 12.

Производные гидразина обладают широким спектром биологического действия. Среди них особое место занимают соединения с антибактериальными свойствами—гидрази́ды, тиосемикарбазиды, тиосемикарбазоны, гидрази́догидразоны [1,2]. Замещенные аминогуанидины, наряду с гипогликемической активностью [3], обладают и антибактериальным действием [4].

Продолжая исследования в области производных гидразина, мы изучили реакцию 4-алкоксибензилхлоридов [5] с гидразином. Для 4-метоксибензилхлорида она осуществлена Костом [6].

Реакция проводилась в среде эфира. Во избежание карбонизации и окисления продукта синтез проводился в атмосфере азота.

Кроме основного продукта I (48—55%), выделена высококипящая фракция II (25—30%), которая по данным элементарного анализа соответствует дизамещенному гидразину. При взаимодействии с альдегидом это вещество не дает гидразона. Это доказывает, что дизамещенный гидразин имеет симметричное строение.

N-Замещенные гидразиды VI синтезированы взаимодействием гидразинов I с хлорангидридом триметилуксусной кислоты в среде абсолютного бензола. Продукты выделены и идентифицированы в виде гидрохлоридов (табл. 5). В хроматограммах оснований R_1 в пределах 0,55—0,60. 1-N-4'-Алкоксибензил-3-метилпиразолоны-5 (VII) получены при действии ацетоуксусного эфира на исходные гидразины (табл. 6).

Экспериментальная часть

4-Алкоксибензилгидразины. К 32 г (0,64 моля) 80%-ного гидрата гидразина при перемешивании в атмосфере азота прикапывают 0,064 моля 4-алкоксибензилхлорида в 50 мл эфира. Нагревают на водяной бане 2 часа. Экстрагируют эфиром, эфирные вытяжки сушат над прокаленным серноокислым натрием. После отгонки растворителя остаток перегоняют в вакууме. Гидрохлориды получают действием эфирного раствора хлористого водорода на 4-алкоксибензилгидразины, растворенные в эфире (табл. 1).

N-4-Алкоксибензил-N-фенилтиосемикарбазиды (III). Смесь 0,01 моля 4-алкоксибензилгидразина, 1,35 г (0,01 моля) фенилизотиоцианата и 10 мл абсолютного этанола оставляют на ночь на холоду. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают абсолютным эфиром и перекристаллизовывают из абсолютного этанола (табл. 2).

N-4-Алкоксибензаль-N'-4'-метоксибензилгидразины (IV). 1,52 г (0,01 моля) 4-метоксибензилгидразина, 0,011 моля 4-алкоксибензальдегида и 20 мл абсолютного этанола нагревают на водяной бане 3 часа. Охлаждают, выпавшие кристаллы отфильтровывают и промывают абсолютным эфиром; перекристаллизация из абсолютного ацетона (табл. 3).

Сульфаты 4-алкоксибензиламиногуанидинов (V). Смесь 0,02 моля 4-алкоксибензилгидразина, 2,8 г (0,02 моля) сульфата S-метилизотимочевинины и 15 мл воды кипятят в течение 6 часов. Отгоняют досуха растворитель, к сухому остатку добавляют абсолютный эфир. Кристаллы отфильтровывают и перекристаллизовывают из этанола (табл. 4).

Гидрохлориды 1-N-4'-алкоксибензилгидразидов триметилуксусной кислоты (VI). К раствору 0,04 моля 4-алкоксибензилгидразина в 30 мл абсолютного бензола при перемешивании прикапывают 2,4 г (0,02 моля) хлорангидрида триметилуксусной кислоты в 30 мл абсолютного бензола.

Таблица 1

R	Выход, %	Т. кип., °С/мм	Т. пл., °С	Молекулярная формула	d_4^{20}	n_D^{20}	MR _D		Анализ гидрохлоридов, %								Т. пл. гидрохлорида, °С
							найдено	вычислено	C		H		N		Cl		
									найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	
CH ₃ *	56,0	122—124/1	36—37	C ₈ H ₁₃ N ₂ O	—	—	—	—	51,04	50,87	6,80	6,94	14,67	14,84	18,76	18,79	196—197
C ₂ H ₅	54,2	129—131/1	40—41	C ₉ H ₁₄ N ₂ O	1,0430	1,5440	50,31	49,59	53,48	53,33	7,71	7,45	13,99	13,82	17,27	17,49	154—155
C ₃ H ₇	48,1	136—138/1	48—49	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O	—	—	—	—	55,71	55,42	7,82	7,90	12,71	12,92	15,96	16,36	145—146
<i>н.з.</i> C ₃ H ₇	49,4	118—120/1	—	C ₁₀ H ₁₆ N ₂ O	1,0118	1,5327	53,53	53,44	55,50	55,42	7,70	7,90	13,08	12,92	16,36	16,36	110—111
C ₄ H ₉	50,1	147—149/1	51—52	C ₁₁ H ₁₈ N ₂ O	1,0078	1,5252	59,09	58,06	57,31	57,25	8,23	8,30	11,96	12,13	15,62	15,79	157—138

* По литературным данным [6], т. пл. гидрохлорида 187—189° (из спирта).

Таблица 2

R	Выход, %	Т. пл., °С	Молекулярная формула	А н а л и з, %							
				С		H		N		S	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	73,5	103—104	C ₁₅ H ₁₇ N ₃ OS	62,81	62,68	6,09	5,96	14,88	14,62	11,27	11,15
C ₂ H ₅	72,6	110—111	C ₁₆ H ₁₉ N ₃ OS	63,52	63,75	6,47	6,35	14,17	13,94	10,66	10,63
C ₃ H ₇	60,1	115—116	C ₁₇ H ₂₁ N ₃ OS	64,47	64,72	6,89	6,71	13,15	13,32	9,98	10,16
<i>изо</i> -C ₃ H ₇	50,6	151—152	C ₁₇ H ₂₁ N ₃ OS	64,77	64,72	6,62	6,71	13,21	13,32	9,96	10,16
C ₄ H ₉	70,1	124—125	C ₁₈ H ₂₃ N ₃ OS	65,82	65,61	6,91	7,03	12,53	12,75	9,92	9,73

Таблица 3

R	Выход, %	Т. пл., °С	Молекулярная формула	А н а л и з, %					
				С		H		N	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	72,1	137—138	C ₁₆ H ₁₈ N ₂ O ₂	71,02	71,08	6,50	6,71	10,35	10,36
C ₂ H ₅	61,6	122—123	C ₁₇ H ₂₀ N ₂ O ₂	72,08	71,80	7,17	7,08	10,11	9,85
C ₃ H ₇	53,7	120—121	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂	72,51	72,45	7,45	7,43	9,07	9,38
<i>изо</i> -C ₃ H ₇	64,3	125—126	C ₁₈ H ₂₂ N ₂ O ₂	72,69	72,45	7,08	7,43	9,43	9,38
C ₄ H ₉	60,0	97—98	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₂	72,83	73,04	7,58	7,74	8,65	8,96
<i>изо</i> -C ₄ H ₉	58,1	112—113	C ₁₉ H ₂₄ N ₂ O ₂	73,16	73,04	7,61	7,74	8,94	8,96
C ₅ H ₁₁	49,4	89—90	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₂	73,41	73,58	7,90	8,02	8,67	8,58
<i>изо</i> -C ₅ H ₁₁	42,8	93—94	C ₂₀ H ₂₆ N ₂ O ₂	73,62	73,58	8,24	8,02	8,29	8,58

Температуру реакционной смеси поддерживают в пределах 15—20°. Выделившийся белый осадок гидрохлорида 4-алкоксибензилгидразина отфильтровывают, отгоняют большую часть бензола, добавляют абсолютный эфир. Выпавший осадок отфильтровывают и сушат в вакуум-эксикаторе. Перекристаллизация из смеси абсолютного этанола и абсолютного эфира (табл. 5).

1-N-4'-Алкоксибензил-3-метилпиразолоны-5 (VII). Смесь 0,02 моля 4-алкоксибензилгидразина и 2,6 г (0,02 моля) ацетоуксусного эфира нагревают на водяной бане в течение часа, затем охлаждают и добавляют 30 мл петролейного эфира. Выпавшие кристаллы отфильтровывают. Перекристаллизация из смеси абсолютного и петролейного эфиров (табл. 6).

Таблица 4

R	Выход, %	Т. пл., °C	Молекулярная формула	Анализ, %			
				N		H	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	67,8	масло	C ₉ H ₁₄ N ₄ O · 0,5H ₂ SO ₄	23,03	23,03	13,41	13,18
C ₂ H ₅	60,0	137—138	C ₁₀ H ₁₆ N ₄ O · 0,5H ₂ SO ₄	21,79	21,77	12,68	12,46
C ₃ H ₇	64,0	152—153	C ₁₁ H ₁₈ N ₄ O · 0,5H ₂ SO ₄	20,50	20,64	11,53	11,81
изо-C ₃ H ₇	48,2	147—148	C ₁₁ H ₁₈ N ₄ O · 0,5H ₂ SO ₄	20,72	20,64	11,98	11,81

Таблица 5

R	Выход, %	Т. пл., °C	Молекулярная формула	Анализ, %					
				C		H		N	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	45,2	218—219	C ₁₃ H ₂₁ N ₂ O ₂ Cl	57,50	57,27	7,80	7,75	10,08	10,27
C ₃ H ₅	38,9	215—216	C ₁₄ H ₂₃ N ₂ O ₂ Cl	58,88	58,62	7,80	8,08	9,62	9,76
C ₃ H ₇	42,5	222—223	C ₁₅ H ₂₅ N ₂ O ₂ Cl	59,63	59,88	8,59	8,37	9,02	9,31
изо-C ₃ H ₇	44,0	217—218	C ₁₅ H ₂₅ N ₂ O ₂ Cl	60,01	59,88	8,30	8,37	8,97	9,31

Таблица 6

R	Выход, %	Т. пл., °C	Молекулярная формула	Анализ, %					
				C		H		N	
				найдено	вычислено	найдено	вычислено	найдено	вычислено
CH ₃	73,4	127—128	C ₁₃ H ₁₄ N ₂ O ₂	66,33	66,03	6,30	6,07	12,61	12,83
C ₃ H ₅	62,3	111—112	C ₁₃ H ₁₆ N ₂ O ₂	67,50	67,21	6,70	6,94	11,91	12,06
C ₃ H ₇	56,1	107—108	C ₁₄ H ₁₈ O ₂ N ₂	68,07	68,26	7,52	7,36	11,40	11,37
изо-C ₃ H ₇	57,7	89—90	C ₁₄ H ₁₈ N ₂ O ₂	68,33	68,26	7,42	7,36	11,52	11,37

ՍԻՆԹԵԶՆԵՐ 4-ԱԼԿՕՔՍԻԲԵՆԶԻԼԶԻԴՐԱԶԻՆՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

Հ. Ա. ՀԱՐՈՅԱՆ և Ն. Ս. ԻՐԱԴՅԱՆ

Ա մ փ ո փ ու մ

Ուսումնասիրված է 4-ալկօքսիբենզիլքլորիդների փոխազդումը հիդրազինի հետ: Ստացված 4-ալկօքսիբենզիլհիդրազիններն օգտագործված են տեղակալված թիոսեմիկարբազիդների, հիդրազոնների և ամինազուանիդինների սինթեզում, նրանց հակաբակտերիալ հատկություններն ուսումնասիրելու նպատակով: Սինթեզված են նաև տրիմեթիլքացախաթթվի N-տեղակալված հիդրազիդների և պիրազոլոնի մի շարք ածանցյալներ:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. М. Н. Мухина, Хим. фарм. ж., 4, (4), 23 (1970).
2. R. S. Varma, K. C. Gupta, A. Nath, V. S. Mista, Indian J. Microbiol., 4 (1—4), 63 (1964) [С. А., 64, 13124e (1966); R. S. Varma. J. Indian Chem. Soc., 43 (8), 558 (1966); [С. А., 66, 18565f (1967)].
3. J. B. Bream, Пат. США, 3,383,409 [С. А., 69, 76893p (1968)].
4. R. D. Westland, E. R. Karger, B. Green, J. R. Dice, J. Med. Chem., 11 (1), 85 (1968).
5. А. Л. Мнджоян, А. А. Ароян, Науч. тр. ЕГУ, 36, 21 (1952); А. Л. Мнджоян, А. А. Ароян, Т. Р. Овсепян, Изв. АН АрмССР, ХН, 13, 276 (1960).
6. А. Н. Кост, Р. С. Сагунян, ЖОХ, 33, 2011 (1963).
7. F. Murphy, I. M. Barber, S. J. Kilpatrick, Lancet, 1, 139 (1961); A. P. Grant, Lancet, 1, 455 (1961); M. Jose, P. Gaser, Cordiologia (Basel), 38, 215 (1961); H. A. Мухина, А. Г. Гилев, В. Г. Клименко, Мед. пром. СССР, 7, 9 (1965).