РЕАКЦИИ НЕПРЕДЕЛЬНЫХ СОЕДИНЕНИЙ

XCIV. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОЛЬВОМЕРКУРИРОВАНИЯ-ДЕМЕРКУРИРОВАНИЯ ВИНИЛ- И ПРОПЕНИЛАЦЕТИЛЕНОВ

Ж. А. ЧОБАНЯН, С. Ж. ДАВТЯН и Ш. О. БАДАНЯН

Институт органической химии АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 16 III 1982

Установлено, что ацциомеркурирование-демеркурирование пропенил- и винилацетиленов протекает региоспецифично по двойной связи, в то время как оксимеркурирование последнего—по тройной связи.

Табл. 3, библиографических ссылок 20.

Известно, что дизамещенные терминальные олефины по отношению к сопряженному меркурированию более реакционноспособны, чем их монозамещенные аналоги, причем как они, так и некоторые диены реагируют региоселективно [1]. Изопропенил- и циклогексенилацетилены вступают в реакцию сопряженного меркурирования в OH и NH кислотах по тройной связи, лишь в случае изопропенилацетилена наблюдается частичное присоединение амина по двойной связи. В настоящей работе изучено сопряженное меркурирование-демеркурирование винилацетилена и ряда его производных в присутствии спиртов, кислот и аминов.

Наши исследования показали, что при 25—30° метоксимеркурирование винилацетилена и его демеркурирование натрийборгидридом (НБГ) в водно-щелочной среде приводят к кетозфиру IV, а при 60° кроме IV, выделен 2,2,4-триметоксипутан (VI).

Реакция ациооксимеркурирования-демеркурирования винилацетилена в уксусной кислоте также протекает по тройной связи, причем региоселективно, с образованием 2-ацетокси-1,3-бутадиена (VIII) и продукта его гидролиза—метилвинилкетона (IX).

Далее оказалось, что координированные комплексы вторичных алифатических аминов с ацетатом ртути с винилацетиленом взаимодействуют при 25—30°. Обработка реакционной смеси порошкообразным БГН в безводной среде приводит к смеси алкиниламинов XII и диаминов XVII. При увеличении времени реакции, повышении температуры до 50°, а также при употреблении избытка вторичных аминов (винилацетилен: амин, 1:5) получаются в основном диамины XVII. При проведении реакции с диметил- и диэтиламинами выделяются также аллениламины XVIII с низкими выходами. Как и ожидалось, гидрогенолиз реакционной смеси в водно-щелочной среде приводит к аминоспиртам XXIII. Отдельным опытом было показано, что алкиниламины XII также легко подвергаются аминимеркурированию-демеркурированию с образованием диаминов XVII. Все сказанное указывает на то, что в изучаемой реакции, в отличие от изопропенил- и циклогексенилацетиленов [2—4], амины в первую очередь ориентируются на двойную связь винилацетилена.

XII. R = R' = CH₃; C₂H₅; R = R' = (CH₂)₅, (CH₂)₂O(CH₂)₂

XVII. R = R' = CH₃; R = R' = (CH₂)₅, (CH₂)₂O(CH₂)₂

XVIII. R = R' = CH₃, C₂H₅

По всей вероятности, в начальном акте аминные комплексы ацетата ртути присоединяются к винилацетилену по положениям 1,2 или 1,4, однако наличие аллениламинов* XVIII в виде смеси с алкиниламинами в случае диметил- (33,5%) и диэтиламинов (8%), а также тот факт, что метилвинилацетилен не вступает в реакцию аминимеркурирования-демеркурирования с алифатическими вторичными аминами позволяют отдать предпочтение 1,4-присоединению.

* Идентифицировано с известными образцами, синтезировано по методу [16].

Образование алкиниламинов XII в полярных и их отсутствие в неполярных растворителях свидетельствуют о протекании реакции через промежуточные соединения XV с их последующей прототропией в XXI или XXV. Исходя из того, что независимо от условий восстановления получают алкиниламины XII, следует отдать предпочтение образованию конечных продуктов по пути А, т. к. в случае восстановления в водно-щелочной среде по пути Б алкиниламины XII не должны были образоваться.

В продолжение исследований было выяснено, что в аналогичных условиях сопряженное присоединение ароматических аминов к винилацетилену протекает экзотермично. Для обеспечения хороших выходов необходимо поддерживать температуру реакции при 25—30°. Восстановление реакционной смеси БГН в неводных средах приводит только к диаминам XXX независимо от полярности растворителя, а в водно-щелочных средах—к аминспиртам XXXI. Отсутствие при этом моноаминов XXXIII, по всей вероятности, объясняется тем, что промежуточное ртутьорганическое соединение XXVIII сравнительно быстрее вступает в реакцию аминмеркурирования-демеркурирования, чем исходный винилацетилен. Отметим, что при проведении реакции аминмеркурирования-демеркурирования винилацетилена с анилином при эквимолекулярных количествах реагентов в отличие от изопропенилацетилена получают N-фенилпирролидин (XXXII) и диамин XXX. Образование N-фенилпирролидина дает возможность предполагать, что ароматические амины также присоединяются в 1,4-положения с образованием промежуточного соединения XXVIII, которое далее переходит в N-фенилпирролидин.

Поведение пропенилацетилен в реакции аминмеркурирования-демеркурирования резко отличается от поведения изопропенилацетилен. Он реагирует аналогично винилацетилену и приводит к образованию алкиниламинов XXXV и диаминов XXXVI в случае вторичных аминов, и только диаминов XXXVI в случае ароматических аминов.

Необходимо отметить, что метилвинилацетилен вступает в реакцию аминмеркурирования-демеркурирования с ароматическими аминами лишь при 60° , приводя с низким выходом к 1,4-дианилинопентану (XXXVIII).

Полученные результаты по сольвомеркурированию-демеркурированию винил-, метилвинил- и пропенилацетиленов, а также ранее проведенные нами исследования [2—5] позволяют заключить, что региохимия и реакционная способность енинов по отношению к сольвомеркурированию в основном определяются их углеродным скелетом.

Экспериментальная часть

Спектры ПМР сняты на приборе «Perkin-Elmer R-12B» с рабочей частотой 60 МГц (внутренний стандарт—ГМДС). ИК спектры получе-

ны на спектрофотометре «UR-20» в тонком слое. ГЖХ анализ проводили на приборе «ЛХМ-8МД»—3, колонка 1,2 м×3 мм, 5% «SE-30» на хроматоне «N-AW», газ-носитель—гелий, скорость 40 мл/мин.

2,2,4-Триметоксибутан (VI). В смесь 100 мл абс. метанола и 16 г (0,05 моля) ацетата ртути при 30—35° и перемешивании пропускали 2,6 г (0,05 моля) винилацетилена. Перемешивали при той же температуре 2 ч, затем еще 4 ч при 60°. Восстанавливали 1,8 г (0,047 моля) порошкообразного БГН. После восстановления реакционную смесь перемешивали 2 ч и экстрагировали эфиром. Эфирный экстракт промывали водой и сушили сульфатом натрия. Получили 1,8 г (35%) 4-метокси-2-бутанона (IV) с т. кип. 50°/17 мм [6] и 3,7 г (50%) VI с т. кип. 63°/20 мм, n_D^{20} 1,4100 [7, 8].

4-Метокси-2-бутанон (IV). Реакцию проводили аналогично вышеописанному при 30—35° 4 ч. Получили 2,3 г (45%) IV с т. кип. 50°/17 мм, n_D^{20} 1,4050, 2,4-динитрофенилгидразон, т. пл. 83—85° (из этанола) [6].

2-Ацетокси-1,3-бутадиен (VIII). В смесь 30 мл уксусной кислоты и 16 г (0,05 моля) ацетата ртути при 30—35° и перемешивании пропускали 2,6 г (0,05 моля) винилацетилена. Через 1 ч температуру реакционной смеси поднимали до 60° и перемешивали еще 1 ч. Восстанавливали 1,8 г (0,047 моля) БГН в 50 мл 3 М раствора едкого натра, затем перемешивали 30 мин и экстрагировали эфиром. Эфирный экстракт промывали 10% раствором поташа, затем водой и сушили сульфатом натрия. Получили 1,1 г (19,6%) VIII с т. кип. 64—66°/50 мм, n_D^{20} 1,4520 [9] и 0,9 г (26%) метилвинилкетона (IX) с т. кип. 76—77°/680 мм, n_D^{10} 1,4130 [10].

Общая методика аминомеркурирования-демеркурирования винилацетилена. а) *Восстановление порошкообразным боргидридом натрия.* В смесь, полученную из 16 г (0,05 моля) ацетата ртути, 0,15 моля вторичного амина (табл. 1, 2) в 30 мл ДМСО, при 30—35° и перемешивании пропускали 2,6 г (0,05 моля) винилацетилена. Перемешивали при той же температуре 4 ч и небольшими порциями добавляли 1,8 г (0,047 моля) порошкообразного БГН. Перемешивание продолжали 3 ч, прикапали 50 мл абс. метанола, через 3 ч добавили 50 мл эфира, затем 50 мл воды. Эфирный слой отделили, водный дважды экстрагировали эфиром (по 50 мл). Эфирные экстракты объединяли и подкисляли 18% соляной кислотой. Эфирный слой промывали водой и сушили сульфатом натрия. После отгонки эфира остатка не осталось. Водный раствор органических оснований нейтрализовали поташом, экстрагировали эфиром. Эфирный раствор промывали водой и сушили сульфатом натрия. После отгонки эфира остаток перегнали в вакууме. Физико-химические константы полученных ацетиленовых аминов XII и диаминов XVIII приведены в табл. 1, 2. Во всех случаях после отгонки в колбе оставалось от 2 до 4,3 г азотодержащего неперегоняющегося вещества.

б) *Восстановление боргидридом натрия в 3 М растворе едкого натра.* Восстановлением реакционной смеси 1,8 г (0,047 моля) БГН в 3 М растворе едкого натра, полученной по вышеприведенной методике, получают аминокспирты XXIII, физико-химические константы которых приведены в табл. 3.

Таблица 1

Алкилпиперидины XII

R	R'	Выход, %	Т. кип., °C/мм	n_D^{20}	ИКС. cm^{-1} ($\equiv CH$)	Спектр ПМР (δ , м. д., J, Гц)	Лит-ра
$(CH_2)_2O(CH_2)_2$		30	63/3	1,4763	2130, 3300	1,9 т ($\equiv CH$, 1H, J=2,2), 2,1—2,7 м [$(CH_2)_2N$, $\equiv CCH_2$, 8H], 3,4—3,8 м (β,β - CH_2 -морфолина, 4H)	13
C_2H_5	C_2H_5	29	78/60	1,4400	2130, 3320	0,91 т [$2(CH_2CH_2)$, 6H, J=7,5], 1,75 т ($\equiv CH$, 1H, J=2,2), 2,00—2,70 м [$(CH_2)_2NCH_2CH_2$, 8H]	14
$(CH_2)_5$		19	82/15	1,4750	2130, 3320	1,3—1,6 м (β,β,γ - CH_2 -пиперидина, 6H), 1,75 т ($\equiv CH$, 1H, J=2,2), 2,10—2,50 м [NCH_2 , α,α - CH_2 -пиперидина, $\equiv CCH_2$, 8H]	15
CH_3	CH_3	10	*78—84/680	—	2130, 3320, 1965	XVIII) 2,18 с [$N(CH_3)_2$, 6H], 2,93 д. т. (NCH_3 , 2H), 4,6—5,3 м ($=CH$, 3H) XII) 1,82 т ($\equiv CH$, 1H), 2,18 с [$N(CH_3)_2$, 6H], 2,12—2,5 м (CH_2CH_2 , 4H)	16

* Температура перегонки смеси XVIII и XII (1:2, по ГЖХ).

Диамины XVII

R	R'	Выход, %	Т. кип., °С/мм	n_D^{20}	Спектр ПМР (δ , м. д., J, Гц)	Лит-ра
(CH ₂) ₂ O	(CH ₂) ₂	20	128,2	1,4870	0,09 д (CHCH ₃ , 3H, J=6,2), 1,2—1,7 м (CH ₂ CH ₂ CH, 2H), 2,1—2,6 мм [2(α , α -CH ₂ -морфолина), NCH, NCH ₂ , 1H], 3,53 м (β , β -CH ₂ -морфолина, 8H)	17
CH ₃	CH ₃	14	70'40	1,4320	0,9 д (CHCH ₃ , 3H, J=6,2), 1,3—1,6 м (CH ₂ CH ₂ CH, 2H), 2,12 и 2,14 два с [2(NCH ₃) ₂ , 12H], 2,2—2,9 м (NCH ₂ , NCH, 3H)	18
(CF ₃) ₃		26	131,5	1,4880	0,90 д (CHCH ₃ , 3H, J=6,2), 1,3—1,7 мм [2(β , β , γ -CH ₂ -пиперидина, CH ₂ CH ₂ CH, 14H), 2,1—2,7 мм [NCH ₂ , NCH, 2(α , α -CH ₂ -пиперидина, 11H)]	

Таблица 3

Аминоспирты XXIII

R	R'	Выход XXIII, %	Выход XII, %	Т. кип., °С/мм	n_D^{20}	Спектр ПМР (δ , м. д.; J, Гц)	Лит-ра
C ₂ H ₅		28	8	70/10	1,4420	0,88 т [2(NCH ₂ CH ₃), 6H, J=7,5], 0,92 д (CHCH ₃ , 3H, J=6,6), 1,10—1,50 м (CH ₂ CH ₂ CH, 2H), 2,00—2,70 м [N(CH ₂) ₂ , 6H], 3,67 секст. (CH ₂ CHCH ₃ , 1H, J=6,6), 4,65 ш (OH, 1H)	19
(CH ₃) ₃		30	7	95/12	1,4720	1,05 д (CHCH ₃ , 3H, J=6,2), 1,3—1,8 м (β , β , γ -CH ₂ -пиперидина, CH ₂ , 8H), 2,05—2,80 мм [N(CH ₂) ₂ , 6H], 3,82 секст. (CHCH ₃ , 1H, J=6,2), 5,25 ш (OH, 1H)	20
C ₆ H ₅	H	72	—	125,2	1,5610	1,13 д (CHCH ₃ , 3H, J=6,1), 1,65 м (CH ₂ CH ₂ CH, 2H), 3,08 т (NCH ₂ CH ₃ , 2H, J=6,8), 3,6 ш (OH, NH, 2H), 3,8 м (CH ₂ CHCH ₃ , 1H), 6,4—7,2 м (C ₆ H ₅ , 5H)	

1,3-Диморфолинобутан (XVII). Восстановлением реакционной смеси, полученной по вышеприведенному методу (а) при соотношении реагентов ацетат ртути: винилацетилен: морфолин 1:1:5, порошкообразным БГН получено 4,5 г (39,5%) XVII.

1,3-Диморфолинобутан. Восстановлением реакционной смеси, полученной по вышеописанному методу (а), при 40—45° из 7,4 г (0,023 моля) ацетата ртути, 6 г (0,069 моля) морфолина, 3,2 г (0,023 моля) 4-морфолино-1-бутина, 0,87 г (0,023 моля) порошкообразного БГН получено 1,6 г (31%) XVII. Обратное было выделено также 1,4 г (43,7%) 4-морфолино-1-бутина.

1,3-Дианилинобутан (XXX) получен по методике (а) из 16 г (0,05 моля) ацетата ртути, 14 г (0,15 моля) анилина, 2,6 г (0,05 моля) винилацетилена в 30 мл ДМСО. Выход 9 г (75%), т. кип. 182°/3 мм, n_D^{20} 1,6070 [11]. Спектр ПМР в CCl_4 (δ , м. д.): 1,05 д ($CHCH_3$, 3H, $J=6,5$ Гц), 1,56 квд (CH_2CH_2CH , 2H, $J=6,5$ Гц), 3,04 т (NCH_2 , 2H, $J=6,5$ Гц), 3,30 ш [2(NH), 2H], 3,46 секст. (NCH, 1H, $J=6,5$ Гц), 6,3—7,2 м [2(C_6H_5), 10H].

1-Анилино-3-бутанол (XXXI) получен восстановлением реакционной смеси, полученной по вышеописанному методу, 1,8 г (0,047 моля) БГН в 50 мл 3 М раствора едкого натра (табл. 3).

N-Фенилпирролидин (XXXII). Из 16 г (0,05 моля) ацетата ртути, 4,7 г (0,05 моля) анилина, 2,6 г (0,05 моля) винилацетилена в 30 мл ДМСО получено 1,2 г (16,3%) N-фенилпирролидина (XXXII) с т. кип. 104°/4 мм, n_D^{20} 1,5860 [12] и 1,8 г (15%) 1,3-дианилинобутана с т. кип. 182°/3 мм, n_D^{20} 1,6060.

1,3-Ди-м-толуидинобутан (XXX). Аналогично проведено присоединение м-толуидина к винилацетилену. Выход 1,3-ди-м-толуидинобутана 7,9 г (59%), т. кип. 201°/5 мм, n_D^{20} 1,5930. Найдено %: N 10,67. $C_{18}H_{24}N_2$. Вычислено %: N 10,45. Спектр ПМР в CCl_4 (δ , м. д.): 1,03 д ($CHCH_3$, 3H, $J=6,5$ Гц), 1,55 квд (CH_2CH_2CH , 2H, $J=6,5$ Гц), 2,12 с [2($CH_2C_6H_4$), 6H], 3,02 т (NCH_2 , 2H, $J=6,5$ Гц), 3,30 ш [2(NH), 2H], 3,35 секст. ($CHCH_3$, 1H, $J=6,5$ Гц), 6,1—7,0 м [2($CH_2C_6H_4$), 8H].

1,4-Дианилинопентан (XXXVIII) получен аналогично методике, приведенной выше для винилацетилена, из 8 г (0,025 моля) ацетата ртути, 7 г (0,075 моля) анилина, 1,7 г (0,025 моля) метилвинилацетилена в 15 мл ДМСО при 50—60° в течение 4 ч. Выход 1 г (15,7%), т. кип. 171—173°/3 мм, n_D^{20} 1,5950. Найдено %: N 10,96. $C_{17}H_{22}N_2$. Вычислено %: N 11,02. Спектр ПМР в CCl_4 (δ , м. д.): 1,10 д ($CHCH_3$, 3H, $J=6,5$ Гц), 1,4—1,9 м (CH_2CH_2 , 4H), 3,11 т (NCH_2 , 2H, $J=6,5$ Гц), 3,45 м [2(NH), 2H], 3,3—4,0 м (NCH, 1H), 6,3—7,2 м [2(C_6H_5), 10H].

Аминомеркурирование-демеркурирование пропенилацетилена. К смеси 16 г (0,05 моля) ацетата ртути, 13 г (0,15 моля) морфолина в 30 мл ДМСО при 30—35° прикапывали 3,3 г (0,05 моля) пропенилацетилена. Перемешивали 4 ч и восстанавливали 1,8 г (0,047 моля) порошкообразного БГН. Дальнейшую обработку и выделение продуктов реакции проводили аналогично указанным выше. Получили 2,1 г (27,4%) 4-морфолино-1-пентина, т. кип. 71°/3 мм, n_D^{20} 1,4775, d_4^{20} 0,9836. Найдено %: N 9,13. $C_9H_{13}NO$. Вычислено %: N 9,15. Спектр ПМР в CCl_4 (δ , м. д.): 1,13 д ($CHCH_3$, 3H, $J=6,5$ Гц), 1,9 т ($\equiv CH$, 1H, $J=2,4$ Гц), 2,2—2,9 м [(CH_2)₂NCHCH₂, 3H], 2,47 м [$N(CH_2)_2$, 4H], 3,60 м (β, β - CH_2 -морфолина, 4H) и 2,4 г (19%) 2,4-диморфолинопентана, т. кип. 125—126°/3 мм,

n_D^{20} 1,4900. d_4^{20} 1,016. Найдено %: N 11,27. $C_{13}H_{26}N_2O_2$. Вычислено %: N 11,57. Спектр ПМР в CCl_4 (δ , м. д.): 0,93 д [2($CHCH_3$), 6H, $J=6,5$ Гц], 1,5—1,9 м ($CHCH_2CH$, 2H), 2,48 м [4(NCH_2), 8H], 2,62 секст. [2(NCH), 2H, $J=6,5$ Гц], 3,60 м (β,β - CH_2 -морфолина, 8H). В колбе остался 1 г азотсодержащей неперегоняющейся массы.

2,4-Дианилинопентан (XXXVI). Аналогично вышеприведенной методике из 8 г (0,025 моля) ацетата ртути, 7 г (0,075 моля) анилина, 1,7 г (0,025 моля) пропенилацетилен в 15 мл ДМСО получено 3 г (47%) XXXVI, т. кип. $161^\circ/1$ мм, n_D^{20} 1,5950. Найдено %: N 10,80. $C_{17}H_{22}N_2$. Вычислено %: N 11,02. Спектр ПМР в CCl_4 (δ , м. д.): 1,12 д [2($CHCH_2$), 6H, $J=6,5$ Гц], 1,4—1,7 м ($CHCH_2CH$, 2H), 3,20 ш [2(NH), 2H], 3,55 м [2($CHCH_2$), 2H], 6,3—7,2 м [2(C_6H_5), 10H].

ՉՀԱԳԵՑԱԾ ՄԻԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ

XCIV. ՎԻՆԻ- եւ ՎՐՈՊԵՆԻԼԱՑԵՏԻԼԵՆՆԵՐԻ ՍՈԼՎՈՄԵՐԿՈՒՐԱՑՄԱՆ-ԴԵՄԵՐԿՈՒՐԱՑՄԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ժ. Ա. ՉՈՐԱՆՅԱՆ, Ս. Ճ. ԴԱՎԹՅԱՆ Լ Ե. Հ. ԲԱԴԱՆՅԱՆ

Ցույց է տրված, որ պրոպենիլ- և վինիլացետիլենների ամինոմերկուրացում-դեմերկուրացումն ընթանում է սեգրոսպեցիֆիկ կրկնակի կապի, իսկ օքսիմերկուրացումը՝ եռակի կապի մոտ:

REACTIONS OF UNSATURATED COMPOUNDS

XCIV. SOME FEATURES OF SOLVOMERCURATION-DEMERCURATION OF VINYL AND PROPENYL ACETYLENES

Zh. A. CHOBANIAN, S. Zh. DAVTIAN and Sh. O. BADANIAN

It has been established that aminomercuration-demercuration of propenyl and vinyl acetylenes proceeds regiospecifically at the double bond, while oxymercuration occurs at the triple bond.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. R. Larock, *Angew. Chem.*, 90, 1, 28 (1978).
2. Ж. А. Чобанян, С. Ж. Давтян, Ш. О. Баданян, *Арм. хим. ж.*, 33, 1003 (1980).
3. Ж. А. Чобанян, С. Ж. Давтян, Ш. О. Баданян, *Арм. хим. ж.*, 34, 854 (1981).
4. С. Ж. Давтян, Ж. А. Чобанян, Ш. О. Баданян, *Арм. хим. ж.*, 35, 527 (1982).
5. Ж. А. Чобанян, С. Ж. Давтян, Ш. О. Баданян, *Арм. хим. ж.*, 33, 589 (1980).
6. С. Г. Мацюян, Г. А. Чухаджян, С. А. Варганян, *ЖОХ*, 29, 451 (1959).
7. L. I. Dolby, K. S. Marshal, *Org. Prep. and Procedures*, 1, 229 (1969); *РЖХ*, 1970, № 14, Ж160.
8. D. B. Killan, G. F. Hennlon, J. A. Nieuwland, *J. Am. Chem. Soc.*, 56, 1786 (1934); 58, 892 (1936).
9. Ю. А. Горин, Т. Г. Арефьева, Авт. свид. СССР, кл. 12о, 19/03/СО7с/ № 236458.
10. А. Н. Чурбаков, В. Н. Рязанцев, *ЖПХ*, 13, 1464 (1940).
11. I. K. Lewis, G. B. Russell, R. D. Topson, I. Vaughan, *J. Org. Chem.*, 29, 1183 (1964).
12. Ю. К. Юрьев, Г. А. Минкина, *ЖОХ*, 7, 2945 (1937).

13. К. Hideo, A. Jkuo, K. Ryonosuke, H. Katum, J. Med. Chem., 10, 411 (1967).
14. В. А. Корнер, А. А. Петров, ЖОХ, 30, 1, 918 (1960).
15. А. Т. Бабалян, К. Ц. Тагмзян, Э. С. Ананян, Г. Т. Бабалян, Арм. хим. ж., 19, 366 (1966).
16. С. А. Варганян, Ш. О. Бадамян, Изв. АН Арм.ССР, 15, 231 (1962).
17. М. Е. Вренпал, Р. Н. Moss, H. Schutze, E. L. Yeukeu, Фр. пат. № 2313378 (1977); РЖХ, 1978, № 7, 0181П.
18. Е. Т. Головин, Ю. И. Семенова, М. А. Передрева, В. М. Быстров, Изв. вузов, Химия и хим. технология, 10, 888 (1967).
19. К. Tuda, S. Hukustma, A. Oguri, J. Pharm. Soc. Japan, 61, 69 (1941); С. А. 36, 3154^а (1942).
20. С. Mannich, W. Hof, Arch. Pharm., 265, 589 (1927); С. А. 22 (1), 590^а (1928).

Армянский химический журнал, т. 36, № 7, стр. 451—456 (1983 г.)

УДК 547—471.1

ПРОИЗВОДНЫЕ АРИЛАЛКИЛАМИНОВ

XVIII. СИНТЕЗ И ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ НЕКОТОРЫХ 3-[2-ГИДРОКСИ-4(ИЛИ 5)-МЕТИЛФЕНИЛ]-3-ФЕНИЛ-Н- (АРИЛАЛКИЛ) ПРОПИЛАМИНОВ

Р. С. БАЛАЯН, М. Г. АКОПЯН, А. А. КАЛТРИКЯН, О. М. АВАКЯН и
Э. А. МАРКАРЯН

Институт тонкой органической химии им. А. Л. Мнджояна
АН Армянской ССР, Ереван

Поступило 16 IV 1982

Конденсацией метилового эфира коричной кислоты с *мета*- или *пара*-крезолами получены 6-(или 7)-метил-4-фенил-3,4-дигидрокумаринны. Взаимодействием последних с арилалкиламинами выделены соответствующие амиды, восстановленные до вторичных аминов.

Табл. 2, библиографические ссылки 9.

В ранее опубликованных работах [1—5] сообщалось о высокой биологической активности замещенных диарилпропиламинов, содержащих в одном из бензольных колец метильную или гидроксильную группы [1, 2].

Целью настоящей работы явился синтез соединений XVII—XXVI, сочетающих обе указанные группы.

Амины XVII—XXVI получены по следующей схеме: