ԱՐԻՕՔՍԻԱՑԵՏԻԼՑԻԱՆԱՄԻԳՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶԸ ԵՎ ՆՐԱՆՑ
ՈՐՈՇ ՓՈՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

Է. Ն. ՀԱՄԲԱՐՏՈՒՄՅԱՆ, Գ. Ս. ՀԱՄԱԶԱՍՊՅԱՆ Ե Վ. Վ. ԴՈՎԼԱՏՅԱՆ

Արիօքսիթացախաթթուների ընդհանրացման և կալցիումի թթու ցիանամիդի փոխազդմամբ ստացվել են արիօքսիացետիլցիանամիդներ: Վերջիններիս և արիլ(մեթիլ)իզոցիանամիդների փոխազդմամբ սինթեզվել են նոր N-արիօքսիացետիլ-N-ցիան-N'-արիլ(մեթիլ)միզանյութեր:

SYNTHESIS AND SOME REACTIONS OF
ARYLOXYACETYLCYANAMIDES

E. N. HAMBARTSOUMIAN, G. S. HAMAZASPIAN and V. V. DOVLATIAN

The aryloxyacetylcyanamides have been synthesized and some properties have been investigated.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Мельников Н. Н., Баскаков Ю. А. — Химия гербицидов и регуляторов роста растений. М., Госхимиздат. 1962, с. 301.
2. Мельников Н. Н., Новожилов К. В., Белан С. Р., Пылова Т. Н. — Справочник по пестицидам. М., Химия, 1985, с. 106.
3. Саундерс Дж. Х., Фриш К. К. — Химия полиуретанов. М., Химия, 1968, с. 76.
4. Frederic Kurzer, J. Roy Fovell — Org. Synth., 1956, v. 36, p. 8.
5. Pat. 3564607 (1977), USA/Broer G. — С. А., 1971, v. 75, p. 486-2.
6. Мельников Н. Н., Баскаков Ю. А. — Химия гербицидов и регуляторов роста растений. М., Госхимиздат, 1962, с. 635.
7. Гизин Г., Кюсли Е. — Успехи в области изучения пестицидов. М., ИЛ, 1962, т. 3, с. 168.
8. Winnek Ph. S., Anderson G. W., Marson H. W. — J. Am. Chem. Soc., 1942, v. 64, p. 1682.

Армянский химический журнал, т. 43, № 7, стр. 463—468 (1990 г.)

УДК 615.31.547.551

СИНТЕЗ 4-N-(1'-ОКСИ-2',2',2'-ТРИХЛОРЭТИЛ)АМИНО-1,2,4-ТРИАЗОЛА И ЕГО ПРЕВРАЩЕНИЯ

В. В. ДОВЛАТЯН, К. А. ЭЛИАЗЯН и А. М. АКОПЯН

Армянский сельскохозяйственный институт, Ереван

Поступило 30 XII 1988

Исследовано взаимодействие хлорала с 4-амино-1,2,4-триазолом, приводящее к образованию 4-N-(2',2',2'-трихлорэтиламино)-1,2,4-триазола, восстановлением которого получено соответствующее 2,2,2-трихлорэтиламинопроизводное. Последнее легко взаимодействует с арилизоцианатами и четвертичными аммониевыми солями триазинового ряда.

Табл. 2, библиограф. ссылки 5.

Известно, что амины, амиды карбоновых кислот и многие родственные им соединения вступают в реакцию галоформного распада с хлоралем или образуют N-(1'-окси-2',2',2'-трихлорэтил)производные [1, 3].

Из этих двух вероятных направлений взаимодействия аминотриазол, как показали наши опыты, под действием хлорала превращается в продукт конденсации—4-N-(1'-окси-2',2',2'-трихлорэтил)амино-1,2,4-триазол (I).

Нам показалось перспективным заместить гидроксильную группу в указанном соединении хлором, что привело бы к 4-N(1',2',2'2'-тетрахлорэтил)амино-1,2,4-триазолу (II). Благодаря наличию чрезвычайно подвижного атома хлора у α -углерода указанный хлорид мог бы быть применен во всевозможных синтезах биологически активных веществ, в том числе пестицидов.

Однако при действии пятихлористого фосфора и его аналогов на соединение I вместо ожидаемого тетрахлорида II был получен гидрохлорид 4-(2',2'2'-трихлорэтилимино)-1,2,4-триазола (III), образование которого можно представить по одной из ниже указанных схем.

Ввиду того, что процесс хлорирования проводился в мягких условиях, исключая реакцию дегидрохлорирования, можно полагать, что образование соединения III имеет место в результате прямой дегидратации соединения I и присоединения образующегося в ходе реакции хлористого водорода к соединению IV.

В ходе изыскания путей синтетического применения соединения IV нами осуществлены его гидрирование и присоединение аммиака.

Полученные таким образом 4-(2',2'-трихлорэтил)амино- (V) и 4-(1'-амино-2',2',2'-трихлорэтил)амино-1,2,4-триазолы (VI) не ацилируются под действием ангидридов кислот, в том числе и сульфохлоридов, и не образуют дитиокарбаматов с сероуглеродом в присутствии оснований или оксидом цинка. Полученные данные, по-видимому, следует объяснить пониженной нуклеофильностью атома азота аминогруппы под действием сильно электрооакцепторной CCl_3 -группы.

Аналогично ведет себя 4-бензиламино-1,2,4-триазол (VIII), полученный восстановлением соответствующего бензалиминотриазола VII [4].

Изучение поведения приведенных выше соединений в реакциях, характерных для аминов, показало, что они сравнительно гладко реагируют с арилизоцианатами и чрезвычайно реакционноспособными четвертичными аммониевыми солями триазинового ряда [5].

Полученные соединения представляют самостоятельный интерес ввиду их очевидной родственности с производными мочевины и симм-триазина, проявляющих высокую и селективную пестицидную активность.

- IX. $\text{Ar}=\text{C}_6\text{H}_5$; X. $\text{Ar}=\text{2-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4$; XI. $\text{Ar}=\text{4-CH}_3\text{C}_6\text{H}_4$; XII. $\text{Ar}=\text{4-ClC}_6\text{H}_4$;
 XIII. $\text{Ar}=\text{3,4-Cl}_2\text{C}_6\text{H}_3$; XIV. $\text{R}=\text{R}'=\text{N}(\text{CH}_3)_2$; XV. $\text{R}=\text{R}'=\text{N}(\text{C}_2\text{H}_5)_2$;
 XVI. $\text{R}=\text{R}'=\text{NHC}_2\text{H}_5$; XVII. $\text{R}=\text{NHC}_2\text{H}_5$; $\text{R}'=\text{NHC}_6\text{H}_5$;
 XVIII. $\text{R}=\text{OCH}_3$; $\text{R}'=\text{N}(\text{CH}_3)_2$

Экспериментальная часть

ИК спектры сняты на спектрометре «UR-20», масс-спектры—на «МХ-1303» с прямым вводом образца в область ионизации. Спектры ПМР получены на приборе «Varian T-60». ТСХ проведена на пластинках «Silufol UV-254», проявитель—БФС+0,4% лимонная кислота.

4-*N*-(1'-Окси-2',2',2'-трихлорэтиламино)-1,2,4-триазол (I). К 1,7 г (0,02 моля) 4-амино-1,2,4-триазола в 10 мл дихлорэтана в присутствии каталитических количеств воды, при перемешивании и охлаждении до 0° по порциям добавляют 2,95 г (0,02 моля) свежеперегнанного хлораля. Смесь перемешивают при 20° 24 ч, фильтруют и фильтр промывают гексаном. Получают 4,5 г (97%) соединения I с т. разл. 154—156°. R_f 0,41 (гептан-ацетон, 1:2). ИК спектр, ν , cm^{-1} : 1560 (C=N), 3200—3400 (NH, OH). Найдено, %: Cl 45,57; N 24,43. $C_4H_5Cl_3N_4O$. Вычислено, %: Cl 46,00; N 24,19. ПМР спектр [в $(CD_3)_2CO + D_2O$]; δ , м. д.: 5,0 с (1H, OCH); 8,55 с ([2H, (N=CH)₂]).

Гидрохлорид 4-(2',2',2'-трихлорэтилимино)-1,2,4-триазол (III). К суспензии 2,1 г (0,01 моля) пятихлористого фосфора в 20 мл абс. эфира при 0° и перемешивании по порциям добавляют 2,3 г (0,01 моля) соединения I. Смесь перемешивают при 20° 24 ч, фильтруют, фильтр промывают 20 мл абс. эфира и получают 2,45 г (98%) соединения III с т. разл. 192—194°. R_f 0,37 (ацетон—вода, 4:1). Найдено, %: Cl 57,20; N 22,14. M^+ 212 [—HCl]. $C_4H_4Cl_4N_4$. Вычислено, %: Cl 56,80; N 22,40. M 249,92.

4-*N*-(2',2',2'-Трихлорэтилимино)-1,2,4-триазол (IV). К суспензии 2,5 г (0,01 моля) соединения III в 20 мл ацетона прибавляют 1 г (0,012 моля) $NaHCO_3$ и перемешивают в течение 1 ч. Фильтруют, фильтрат упаривают и получают 1,68 г (78,7%) соединения IV с т. пл. 112—114°. R_f 0,39 (гептан—ацетон, 7:10). Найдено, %: Cl 49,51; N 26,44. M^+ 212. $C_4H_3Cl_3N_4$. Вычислено, %: Cl 49,88; N 26,22. M 213,46. ПМР спектр, (в пиридине $d_5 + ГМДС$), δ , м. д.: 9,4 с [2H, (N=CH)₂-цикл.]; 9,53 с (1H, N=CH экзацикл.).

4-(2',2',2'-Трихлорэтиламино)-1,2,4-триазол (V). К суспензии 2,14 г (0,01 моля) соединения IV в 10 мл воды при 0° и перемешивании по порциям добавляют 0,5 г (0,013 моля) боргидрида Na. Перемешивают 2 ч при 0°, затем 24 ч при 20°. Фильтруют, фильтр промывают 5 мл воды, высушивают и получают 1,6 г (74%) соединения V с т. пл. 160—162° (из ацетона). R_f 0,36 (ацетон-гексан, 2:1). Найдено, %: Cl 49,00; N 26,11. M^+ 214. $C_4H_5Cl_3N_4$. Вычислено, %: Cl 49,11; N 25,98. M 215,47. ПМР спектр, (в $CD_3OD + ГМДС$), δ , м. д.: 4,2 с (2H, CH₂); 8,7 с [2H, (CH=N)₂].

4-(1'-Амино-2',2',2'-трихлорэтиламино)-1,2,4-триазол (VI). К раствору 0,51 г (0,03 моля) аммиака в 10 мл диоксана при 0° и перемешивании по порциям добавляют 4,3 г (0,02 моля) соединения IV. В течение 5 мин иминопроизводное растворяется и начинает выпадать осадок VI, который фильтруют через сутки, высушивают и протирают эфиром. Выход 4,4 г (95%), т. разл. 124—126°. Найдено, %: Cl 45,91; N 30,62. $C_4H_6Cl_3N_5$. Вычислено, %: Cl 46,20; N 30,37.

4-*N*-Арилкарбонамидо-*N*-(2',2',2'-трихлорэтил)-амино-1,2,4-триазо-
лы (IX—XIII) (табл. 1). Смесь 2,14 г (0,01 моля) соединения V и
0,01 моля арилизоцианата в 20 мл абс. толуола в присутствии 2—3
капель пиридина кипятят 8—9 ч. Фильтруют, фильтр промывают гек-
саном и получают соединения IX—XIII (перекр. из 70% этанола.
ТСХ: гептан-ацетон, 1:2).

Таблица 1

Соединения IX—XIII

Ag	Выход, %	Т. пл., °C	Найдено %		Брутто-формула	Вычислено, %		R _f
			Cl	N		Cl	N	
C ₆ H ₅	94	182—183	32,20	21,30	C ₁₁ H ₁₀ Cl ₃ N ₅ O	31,83	20,92	0,43
3-CH ₃ C ₆ H ₄	92	208—210	30,78	20,74	C ₁₂ H ₁₂ Cl ₃ N ₅ O	30,55	20,08	0,54
4-CH ₃ C ₆ H ₄	94	212—214	30,72	2,40	C ₁₂ H ₁₂ Cl ₃ N ₅ O	30,5	20,08	0,51
4-ClC ₆ H ₄	68	220—222	38,13	18,59	C ₁₁ H ₉ Cl ₄ N ₅ O	38,48	18,97	0,38
3,4-Cl ₂ C ₆ H ₃	70	198—200	43,65	17,69	C ₁₁ H ₈ Cl ₅ N ₅ O	43,99	17,34	0,40

ИК спектр соединения IX. ν , см⁻¹: 1541, 150, 159 (C=C), 1650 ($\begin{matrix} \text{O} \\ \diagup \\ \text{C} \\ \diagdown \\ \text{NH} \end{matrix}$),
313, 314 (=CH), 334 (NH).

2,4-Дизамещенные-6-[*N*-(2',2',2'-трихлорэтил)-*N*-(1,2,4-триазолил-4)-
амино]-симм-триазины XIV—XVIII (табл. 2). К суспензии 0,7 г
(0,01 моля) 84% едкого кали в 20 мл сухого ацетона при 0° добав-
ляют 2,14 г (0,01 моля) соединения V и перемешивают при 20°
30 мин до образования соли. По порциям добавляют 0,01 моля соот-
ветствующего хлорида (2,4-дизамещенных-симм-триазинил-6)триметил-
аммония и смесь нагревают при 50—60° 5 ч до прекращения выде-
ления амина. Фильтруют, фильтрат упаривают и соединения XIV—
XVIII осаждают водой, отсасывают и сушат на воздухе.

Таблица 2

Соединения XIV—XVIII

R	R'	Выход, %	Т. пл., °C	R _f	Найдено, %		Брутто-формула	Вычислено, %	
					N	Cl		Cl	N
N(CH ₃) ₂	N(CH ₃) ₂	87	195—197	0,56	27,64	32,89	C ₁₁ H ₁₆ Cl ₃ N ₆	27,98	33,11
N(C ₂ H ₅) ₂	N(C ₂ H ₅) ₂	66	142—144	0,41	24,72	29,23	C ₁₅ H ₂₄ Cl ₃ N ₆	24,39	28,88
NHC ₂ H ₅	NHC ₂ H ₅	94	120—122	0,37	27,61	33,47	C ₁₁ H ₁₆ Cl ₃ N ₆	27,98	33,11
NHC ₂ H ₅	NHC ₃ H ₇ - <i>l</i>	70	165—168	0,37	26,61	31,69	C ₁₂ H ₁₈ Cl ₃ N ₆	26,99	31,94
N(CH ₃) ₂	OCH ₃	87	174—176	0,51	28,70	31,08	C ₁₀ H ₁₃ Cl ₃ N ₆ O	28,98	30,48

* Гептан—ацетон, 1:2.

ИК спектр соединения XIV, ν , см⁻¹: 1530, 1570, 1630 (C=N и C=C).

Масс-спектр: найдено M⁺ (379 и 381), вычислено M 38,5.

4-N-(1'-OXY-2',2',2'-TRICHLOROETHYL)AMINE-1,2,4-TRIAZOLE
ԵՎ ՆՐԱ ՓՈՆԱՐԿՈՒՄՆԵՐԸ

Վ. Վ. ԴՈՎԼԱՏՅԱՆ, Կ. Ա. ԷԼԻԱԶՅԱՆ և Ա. Մ. ՀԱԿՈՐՅԱՆ

Ուսումնասիրված է քլորալի և 4-ամինա-1, 2, 4,-տրիազոլի փոխազդեցությունը, որի արդյունքում առաջացած 4-N-(2', 2', 2',-տրիքլորէթիլմինա) 1, 2, 4-տրիազոլի վերականգնումից ստացվել է համապատասխան 2, 2, 2-տրիքլորէթիլամինածանցյալը: Վերջինս հեշտուլթյամբ փոխազդում է արիլ-իզոցիանատներին և տրիազինային շարքի շորրորդային ամոնիումային աղերին հետ:

4-N-(1'-OXY-2',2',2'-TRYCHLOROETHYL)AMINE-1,2,4-TRIAZOLE
SYNTHESIS AND ITS TRANSFORMATION

V. V. DOVLATIAN, K. A. ELIAZIAN and A. M. HAKOPIAN

It was studied the chlorale and 4-amine-1,2,4-triazole interaction, on which results 4-N-(2,2-trychlorethylemine(1,2,4-triazole's restoration was received consequently 2,2,2-trichlorethylamine derivative. The last one interacts easily on arylisocyanates and triazine rank's with the fourth ammonium salts.

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Rughelmer L. — Ber., 1936, v. 39, S. 1653.
2. Dornow A., Thies H. — Ann., 19.3, v. 581, s. 224.
3. Hellmann H., Opitz Q. — Chem. Ber., 1956, v. 89, s. 81.
4. Becker Heinz G. O., Voetlicher H., Roethling T., Timpe H. J. — C. A., 1966, v. 64, p. 19596gh.
5. Довлатян В. В., Элизян К. А., Агаджанян Л. Г. — ХГС, 1977, № 2, с. 262.

Армянский химический журнал, т. 43, № 7, стр. 468—473 (1990 г.)

УДК 542.952/954

СОПОЛИМЕРИЗАЦИЯ о-ЦИАНБЕНЗАЛЬДЕГИДА СО СТИРОЛОМ

А. А. ДУРГАРЯН, Р. А. АРАКЕЛЯН и Ж. Н. ТЕРЛЕМЕЗЯН

Ереванский государственный университет

Поступило 23 V 1988

Исследована сополимеризация о-цианбензальдегида со стиролом под действием эфирата трехфтористого бора. При сополимеризации имеют место реакции циклизации о-цианбензальдегида и замещения концевых альдегидных единиц активного центра молекулами растворителя и сомономера. Циклообразование уменьшает влияющие реакции замещения на состав сополимера, но не приводит к его устранению.

Табл. 1, библиографических ссылок 7.

При сополимеризации ароматических альдегидов со стиролом при 50° протекает реакция замещения (обмена) концевых альдегидных единиц активного центра молекулами сомономера, растворителя и