

КРАТКИЕ НАУЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ

И. С. Даревский

О систематическом положении кавказской  
ящеричной змеи

Кавказских ящеричных змей до последнего времени в отечественной литературе относили к монотипическому виду *Malpolon monspessulanus* Herzm., не дающему подвиговых форм на всем протяжении своего ареала от Западной Африки до Кавказа [3, 7, 8].

Зарубежные же герпетологи, в частности Мертенс и Мюллер [4], признавая самостоятельность формы *Coluber insignitus*, описанной Жоффруа [2] из Нижнего Египта в 1827 г., считают ее подвигом ящеричной змеи — *Malpolon monspessulanus insignitus*, который распространен на Балканском полуострове (центральная Македония), на некоторых островах Эгейского и восточной части Средиземного морей, в Северной Африке (от Триполи до нижнего Египта), в зап. и сев.-зап. Аравии, в Малой Азии и Иране, откуда через восточное Закавказье проникает на Кавказ и далее до южных районов Заволжья. Номинальная же форма — *Malpolon monspessulanus monspessulanus* [4, 5] — занимает западную — меньшую часть ареала, встречаясь в Зап. Югославии\*, сев. и сев.-зап. Италии, Сицилии, южн. Франции, на Пиринейском полуострове и в сев.-зап. Африке (см. рис.—карту).

Принадлежность кавказских ящеричных змей к восточному подвиду действительно подтверждается при сравнении кавказских, западноазиатских и египетских экземпляров этого вида — с одной стороны, с южноевропейскими и алжирскими — с другой. В общей сложности нами было просмотрено 34 экз. ящеричных змей, хранящихся в Зоологическом институте АН СССР. Зоологическом институте АН АрмССР и Зоологическом музее Московского Государственного университета. При сравнении, помимо 12 экз. типичного подвида, нами было использовано также подробное описание этой формы, имеющееся у Анжела [1].

Основные различия между типичным и восточным подвидами ящеричной змеи, как известно, заключаются в особенностях окраски. Поскольку у этих змей сильно развит возрастной диморфизм, для сравнения брались особи одной длины, т. е. предположительно одного возраста.

\* Мертенс и Мюллер [4] проводят восточную границу типичного подвида через сев.-зап. Италию (Лигурия), однако еще Штраух [6] указывал на нахождение этой змеи в Далмации (Зап. Югославии), откуда имеются также экземпляры в Зоологическом институте АН СССР и в Зоомузее МГУ.

Для окраски взрослых экземпляров типичной формы характерна, в частности, более или менее четко выраженная пятнистость брюха, тогда как у восточного, встречающегося и на Кавказе, подвида, брюхо, как правило, одноцветное—светложелтое или же с незначительной пятнистостью лишь в передней части. Кроме того, края тела, особенно один или два ряда ближайших к брюху туловищных чешуй, у типичного подвида обычно значительно темнее (иногда почти черного цвета), благодаря чему граница между туловищем и брюхом бывает выражена у этой формы особенно четко. У некоторых взрослых ящеричных змей из южной Франции и сев.-зап. Африки, передняя часть тела сверху нередко бывает совершенно черной, что иногда не наблюдается у восточного подвида.

Указанные различия в окраске обоих подвигов ящеричной змеи были отмечены также и у просмотренных нами экземпляров.

Таким образом, кавказских ящеричных змей вместе с иранскими и переднеазиатскими следует относить к восточному подвиду *Malpolon monspessulanus insignitus* (Geoffroy, 1827).

Зоологический институт  
АН АрмССР

Поступило 6 IV 1955 г.

#### Л И Т Е Р А Т У Р А


1. Angel F. Reptiles et amphibiens. Fauna d. Franse, 45, 1946.
2. Geoffroy S. H. Descr. Egipte, Rept. 1827.
3. Никольский А. М. Пресмыкающиеся, 2, Змеи, Фауна России, 1916.
4. Mertens R. и Muller L. Die Amphidien u. Reptilien Europas. Abn. Senck. Naturforsch. Gessellschaft. 451, 1940.
5. Schmidt K. Reptiles a. Amphibians from Southwestern Asia. Zoolog. ser. Field. Mus. Nat. Hist. 24, 27, 1939.
6. Strauch A. Schlangen des Russischen Reiches. Mem. Acad. Sc. St. Petersburg. 7 ser., v. 21, 1873.
7. Терентьев П. В. и Чернов С. А. Определитель пресмык. и земноводных, 1940.
8. Чернов С. А. Герп. фауна АрмССР и НахАССР, Зоологич. сборник Армянск. фил. АН СССР, в. 1, 1939.

Ի. Ս. Դարևսկի

#### ԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՄՈՂԵՍԱՕՋԻ ՄԻՍԵՍՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՏԵՂԻ ՄԱՍԻՆ

#### Ա Մ Փ Ո Փ Ո Ւ Մ

Մինչև վերջին ժամանակներս հայրենական գրականության մեջ այն կարծիքն էր հայտնվում, որ Կովկասի սահմաններում տարածված է կովկասյան օձի տիպիկ ենթատեսակը՝ *Malpolon monspessulanus monspessulanus* (Hermann): Դրա հետ մեկտեղ, արտասահմանյան գրականության մեջ, հատկապես Մերտենսը և Մյուլլերը (4) գտնում էին, որ մոդեսային օձը պատկանում է արևելյան ենթատեսակին՝ *Malpolon monsp. insignitus*



որը տարածված է Առաջավոր Ասիայում, Հյուսիս-արևմտյան Աֆրիկայում  
և Բալկանյան թերակղզում:

Այդ հեղինակների տվյալներով նումինալ տեսակը գրավում է արևալի  
արևելյան մասը, հանդիպելով Արևմտյան Նվրոսայում և Հյուսիս-արև-  
մրտյան Աֆրիկայում:

Արևալի տարրեր կետերից հավաքված՝ մոլեռասձի 32 օրինակների  
համեմատությունը ցույց է տալիս, որ այդ տեսակի կովկասյան օրինակ-  
ները, իրանական և փոքր-ասիական օրինակների հետ միասին, իսկապես  
պատկանում են արևելյան ենթատեսակին՝ *Malpolon monspessulanus insigni-*  
*nitus* (Geoffroy).