

Ս. Կ. ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ

ԱՆԱՍՆԱՐՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՐԱՐՉՐԱՑՄԱՆ ՄԵՒ ՔԱՆԻ  
ԿԱՐՆԱԳՐ ՌԵՋԵՐԱՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Սովետական ժողովրդի առջև յոթնամյակում կանգնած ամենակենսական խնդիրներից մեկը անասնաբուծություն մթերքների լիառատություն ստեղծելն է:

Ինչպես ցույց տվեց գյուղատնտեսության սոցիալիստական վերակառուցման երկարամյա փորձը, անասնաբուծության շեշտակի վերելքը պահանջում է ավելի մեծ ջանքեր, տնտեսությունը վարելու դիտականորեն հիմնավորված ուսումնական զոտոտիրնիկական ու ագրոնոմիական միջոցառումների փոխադարձաբար համաձայնեցված ամրոցական կոմպլեքսի կիրառում: Այդպիսի միջոցառումների հետևողական կիրառման շնորհիվ էր, որ հնարավոր դարձավ կարճ ժամանակամիջոցում՝ վերջին 4—5 տարում լուրջ նվաճումների հասնել անասնապահության զարգացման և անասնաբուծական մթերքների արտադրության ավելացման բնագավառում:

Անասնապահության զարգացման և անասնաբուծական մթերքների արտադրության ավելացման բնագավառում մեր երկրում խոր խոշոր հաջողություններ ձեռք բերվեցին անցած տնտեսական տարում: 1958 թվականի համեմատությամբ, 1959 թվականին խոշոր եղջերավոր անասունների պլանային կոտորվածություններում ու սովխոզներում ավելացավ 18%-ով, այդ թվում կովերինը՝ 14%-ով, խոզերի պլանային ավելացավ 17%-ով, ոչխարներինը՝ 6%-ով, գյուղատնտեսական թռչուններինը՝ 26%-ով: Դեռ 1957 թվականին մեր գերազանցեցինը ԱՄՆ-ին յուղի համախառն արտադրությամբ, իսկ 1958 թվականին՝ նաև կաթի արտադրությամբ:

1959 թվականին Սովետական Միությունը պերադանցեց ԱՄՆ-ին նաև մեկ շնչին արտադրվող յուղի բանակով. բնակչության յուրաքանչյուր շնչին արտադրվեց միջինը 4 կգ յուղ, իսկ ԱՄՆ-ում՝ 3.7 կգ (0.2 կգ պակաս, քան արտադրվել էր 1958 թվականին): Չնայած վերջին տարիներին զգալիորեն ավելացել նաև մսի արտադրությունը, բայց այդ բնագավառում մենք դեռ ետ ենք մնում ԱՄՆ-ից: Ահա թե ինչու մսի պրոբլեմի լուծմանը առանձնապես մեծ ուշադրություն է դարձվում: ՍՄԿՊ Կենտկոմի 1959 թվականի Դեկտեմբերյան պլենումը նշեց, որ ռեալ հնարավորություններ են ստեղծվել մսի արդյունաբերության յոթնամյա պլանը կատարել ժամկետից շուտ՝ 1963 թվականին, և կոչ արեց գյուղատնտեսության բոլոր աշխատողներին պլանից դուրս արտադրել լրացուցիչ 4—5 միլիոն տոննա միս և 1965 թվականին ընդհանուր արտադրանքը հասցնել 20—21 միլիոն տոննայի, որպեսզի յոթնամյակի վերջում մենք հասնենք ԱՄՆ-ին նաև մեկ շնչին արտադրվող մսի բանակով:

Անցած տարում, նախորդ տարվա համեմատությամբ, մսի արտադրությունը (սպանդային քաշով) կոտորվածություններում ու սովխոզներում ավելացավ 27%-ով, իսկ զնումները՝ 34%-ով (կենդանի քաշով), կաթի արտադրանքը,

ավելացավ 15%-ով, իսկ գնումներինը՝ 16%-ով, ձվի արտադրությունը՝ ավելացավ 28%-ով, գնումները՝ 32% -ով, Կենդանական յուղի արտադրությունը տնտեսության բոլոր կատեգորիաների գծով՝ ավելացավ 8<sup>10</sup>/<sub>100</sub> և կազմեց 845 հազար տոննա:

1959 թվականին, 1958 թվականի համեմատությամբ ավելի է գնվել — առաստուղներ և թոշտներ՝ 1,9 միլիոն տոննա, կաթ՝ 2,9 միլիոն տոննա, ձու՝ 1,1 միլիարդ հատ և բուրդ՝ 38 հազար տոննա: Իսկ 1953 թվականի համեմատությամբ, ավելի է գնվել — միս՝ 2,1 տնդամ, կաթ՝՝ գրեթե 2,4 անգամ, ձու՝ 2,2 անգամ և բուրդ՝ 1,8 անգամ:

Պյուղատնտեսության սոցիալիստական սիստեմի խոշոր նախնականի մասին է խոսում նաև տյն փաստը, որ մսի պետական գնումների մեջ կոլտնտեսությունների ու սովխոզների լուսինը անցած տարում կազմեց 83%, իսկ կաթի պետական գնումների մեջ՝ 92%-ով: Դու Նիկոլի մեծ հաղթանակ է:

1959 թվականին՝ յոթնամյակի առաջին տարում, անասնաբուժությունը դարձաճան բնապալառում զղալի նվաճումներ ձեռք բերին նաև Հայաստանի գյուղատնտեսության աշխատողները:

1959 թվականին, 1957 թվականի համեմատությամբ, կոլտնտեսություններում ու սովխոզներում կաթի արտադրությունն ավելացավ 17,5 %-ով, մսինը՝ 24 %-ով, բրդինը՝ 10,3%-ով իսկ ձվինը՝ 81,4%-ով:

Խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը ռեսպուբլիկայում նույն ժամանակամիջոցում ավելացավ 8,3%-ով, այդ թվում՝ կովերինը՝ 18,3%-ով, ուլխարհների և չափերի զլիարանակը՝ 8,4% -ով, խոզերինը՝ 22,9 %-ով, թռչուններինը՝ 92,4% -ով: Մսի արտադրության ավելացման տեսակետից առանձնապես աչքի ընկան Սպիտակի, Հոկալմերերյանի, Եղեղնաձորի, Հրազդանի և Կրասնոսելսկի շրջանների կոլտնտեսություններն ու սովխոզները:

Սպիտակի շրջանի կոլտնտեսություններն ու սովխոզները բարձր ցուցանիշների հասան նաև կաթի արտադրության ամիսացման բնադավառում: 1958 թվականի համեմատությամբ, այդ շրջանի կոլտնտեսություններում ու սովխոզներում կաթի արտադրությունն ավելացավ 30%-ով: Նրանց՝ այդ ցուցանիշի տեսակետից, սպիտակցիներինը գրեթե չգիտեցին Կիրովականի շրջանի կոլտնտեսություններն ու սովխոզները, որոնք կաթի արտադրությունն ավելացրին 28% -ով: Հոկալմերերյանի շրջանի կոլտնտեսություններն ու սովխոզները կաթի արտադրությունն ավելացրին 21%-ով, իսկ Արթիկի, Սղեղնաձորի և Վեդու շրջանների կոլտնտեսություններն ու սովխոզները՝ 16% -ով:

Հայաստանի Կոմպարտիայի XXI համագումարն ըստ պատշաճի գնահատելով ռեսպուբլիկայի գյուղատնտեսության, այդ թվում նաև անասնապահության բնադավառում ձեռք բերված անվիճելի նվաճումները, միաժամանակ նշեց, որ անասնապահության զարգացման և նրա մթերատվության բարձրացման բնադավառում զեռ լուրջ լինալիություններ գոյություն ունեն, եղած հնարավորությունները լրիվ չեն օգտագործվում, որի հետևանքով չեն կատարվում ստանձնված սոցիալիստական պարտավորությունները:

Այդ տեսակետից առանձնապես անբավարար է միճակը Աղինի, Նոյեմբերյանի, Ղափանի, Թալինի, Ամասիայի, Կիրովականի, Դորիսի, Արտաշատի և մի քանի այլ շրջաններում, որտեղ մսի արտադրությունը անցյալ տարվա համեմատությամբ ոչ միայն չավելացավ, այլև, նույնիսկ, նկատելիորեն պակասեց, որի հետևանքով ռեսպուբլիկայի կոլտնտեսություններն ու սովխոզները մսի ար-

սաղորդութիւնը ամէկաջնելու համար ստանձնած պարտավորութիւնը 30 % -ի փոխարին կատարեցին միայն 5 % -ով:

Եւսի արտադրութիւնն ամէկաջնելու վերաբերյալ ստանձնած սոցիալիստական արտադրութիւնները անբաժարաբար կատարեցին Ամասիայի, Ղուկասայի, Կալինինոյի, Ալիսի, Հրադզանի, Բալիսի, Կրասնոսելսկի, Սևանի շրջաններէ կոլտնտեսութիւններն ու սովխոզները:

Ռեսպուբլիկայի կոլտնտեսութիւններում ու սովխոզներում դեռ համարձակութիւն չեն լուծում թռչնաբուծական ֆերմաների խոշորացման հարցերը, չնայած որ հենց մեր ղեկավարելիքում եղած խոշոր թռչնաբուծական տնտեսութիւնների աշխատանքի փորձը համոզիչ կերպով ցույց է տալիս նրանց անվիճելի առավելութիւնները մանր ֆերմաների համեմատութեամբ:

Համագումարն անբաժարաբար համարեց հանրային հոտի, մասնավորապէս խոշոր ու մանր եղջերավոր անասունների ներկայումս զուլթիւն ունեցող անը, տոհմային դործի զբաւթը:

Հոտի վերարտադրութեան տեսակետից դեռ հետ են մնում նաև սնասնութիւնի կալի սովխոզները: 1958 թվականին 100 կովից սովխոզներում ստացիւ են միայն 77 հորթ, 100 մարուց՝ 69 պառ: 1959 թվականին վիճակը մի փոքր բարելավվել է, բայց դեռ հետո է բաւարար լինելուց: Միաժամանակ տնտեսապահական սովխոզների տրեստի սխտեմում կան անհամեմատ ավելի բարձր ցուցանիշներ ունեցող անասնութիւններ: Մրցաշատի սովխոզը (էջմիածնի շրջան) անցյալ տարի յուրաքանչյուր 100 կովից ստացել է 96 հորթ, Ախուրյանի սովխոզը (Ախուրյանի շրջան)՝ 93 հորթ, Գորիսի շրջանի Վերնաշենի սովխոզը 1958 թվականին 100 մարուց ստացաւ 103 պառ: Այս փաստերը խոսում են այն մասին, որ հանրային հոտի վերարտադրութեան վիճակը բոլոր սովխոզներում արմատապէս բարելավու համար կան ուսւ հնարավորութիւններ:

Ակնհայտ է, որ ետ մնացող կոլտնտեսութիւնների, սովխոզների և առանձին շրջանների կողմից պետական պլանային տոտադրանքներն ու ստանձնած սոցիալիստական արտադրութիւնները թերակատարելու հետեանցով է, որ իջնում են նաև սնասնութիւնի համապատասխան արտադրական ցուցանիշները:

Հաղիմ թի հարկ կա ապացուցելու, որ սնասնութիւնի անասնաբուծութեան զարգացման բնագավառում եղած թերութիւնները հետեանը են ամենից առաջ այն բանի, որ կոլտնտեսութիւնների ու սովխոզների մի զգալի մասը հետեողականութիւն չի կիրառում գիտականութիւն հիմնավորված արտադրութիւնի միջոցառումների կոմպլեքսը, վատ է օգտաբործվում առաջավորների փորձը, գիտութեան նվաճումները, եղած ուղեբովները:

Դեռ անցյալ տարի ՀԽՍՀ Կենտկոմի X պլենումը միանգամայն ճիշտ կերպով նշեց, որ անասնաբուծութեան զարգացման խոշորագոտի է կերի բազայի բնդայնման ուղղութեամբ տարվող խիստ անբաւարար աշխատանքը: Այդ անվիճելի ճշմարտութիւն է, քանի որ անասնաբուծութեան զարգացման և նրա մթերատվութեան բարձրացման վճռող պայմանը կերի կալուն բազան է: Վերջին 5—6 տարիա բնթաքում անասնապահութեան զարգացման ապարեղում ՍՍՌՄ-ում ձեռք բերված արմատական բեկման համար մենք առաջին հերթին

սլաբոսլավական և նրա ՍՄԿՊ Կենտրոնական Կոմիտեի կողմից՝ անասնապահության կերի բաղադրիչ ամրագնդման ուղղությամբ հետեզդականորեն իրականացվող հիմնական միջոցառումներին:

Անասնաբուժական միջոցների արտադրության ավելացման գործում կարևոր նշանակություն ունի նաև յուրաքանչյուր մարզում, ռեսպուբլիկայում, ամեն մի տնտեսությունում եղած ռեզերվների հայտնաբերումը և օգտագործումը: Խորադնին ուսումնասիրության ղեկավար հաղթի թե զանվի որևէ կոլտնտեսություն կամ սովխոզ, որը չունենա դեռ չօգտագործված, կամ համենայն դեպս, զեռ լրիվ չօգտագործված սեզերվներ:

Ներկա հողվածում մենք նախատես ենք դրել կանոց ասելի մեր ռեսպուբլիկայի կոլտնտեսություններում ու սովխոզներում եղած մի քանի աչդալիսի կարևոր ռեզերվների վրա, որոնց միշտ օգտագործումը նախադրություն կատարանց մեծ միջոցներ ծախսելու զղալիորեն ավելացնել անասունների զխտքանակը, բարձրացնել նրանց միջնատվությունը և հետևապես ավելացնել անասնաբուժական միջոցների արտադրությունը:

#### 1. ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՀԱՏԻ ԲԵՂՄԱՆՎՈՐՄԱՆ ԽԻՇՏ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒՄԸ ԽՍՀՆԵՐԶՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱՏՈՒՄԸ

Գյուղատնտեսական կենդանիների զխտքանակի ավելացման զխտվոր սեզերվը մայրական հոտի բեղմնավորման ճիշտ կազմակերպումը և ստերջության վերացումն է:

Մեր ռեսպուբլիկայի կոլտնտեսություններում ու սովխոզներում ստերջության վերացման ուղղությամբ վերջին տարիներում որոշ աշխատանք կատարվել է. 1955 թվականին, 1957 թվականի համեմատությամբ, ստերջ կովերի քանակը արականց 6% -ով, ոչխարներինը՝ 2% -ով: Սակայն գոյություն ունեցող վիճակը դեռ հեռու է բավարար լինելուց: 1958 թվականին ստերջ մնալուց կովերի քանակը կոլտնտեսություններում կազմեց 12%, յուրաքանչյուր 100 կովից ստացվեց 87 նորթ, իսկ մի շարք կոլտնտեսություններում և առանձին շրջաններում կովերի ստերջության տակոսը հասնում է մինչև 40—45-ի (Ղափան, Ադին): Առավել ևս յուրջ է վիճակը ոչխարաբուծության մեջ: Ոչխարների ստերջությունը 1958 թվականին հասավ 15% -ի, իսկ առանձին շրջաններում է՛լ ավելի բարձր էր: Առ 1-ը հոկտեմբերի 1959 թվականի ռեսպուբլիկայի կոլտնտեսություններում 100 մայր ոչխարից միջինը ստացվեց 85 դուռ, իսկ 1958 թվականի նույն ժամկետում ստացվել էր ընդամենը 81 դուռ:

Հանրահայտ է, որ ոչխարները շատ պաղպղատ կենդանիներ են, առանձին ցեղերի մոտ դույզ ծնող մարիները կազմում են հոտի 20—25, Լրբեմն մինչև 50 -ը, իսկ Ռումանովյան ցեղի մաքրները մեկ ծնից տալիս են միջինը 2—3 դուռ: Նրբաղեղմ (մերինոսյան) ցեղերը և նրանց խառնածինները նույնպես շատ պաղպղատ են, դույզ ծնող մարիների տակոսը հասնում է 20—25-ի, իսկ առանձին հոտերում մինչև 50-ի: Վերջինիս սովխոզում առաջավոր հովիվ Տ. Գ. Խարչենկոն կովկասյան նրբաղեղմ ցեղի 100 մաքուց ստացել է 146 դուռ: Խտացրած ծին կազմակերպելու ղեկավարում առաջավոր ոչխարաբուծները 100 մաքուց ստանում են մինչև 200 դուռ:



Հայկական ՄԱԹ կոլտեստեսություններում նրբազեղմ, կիսանրբազեղմ և կիսակոպտարուղ ուղխարների բանակը ընդհանուր հոտում ղեռ 1958 թվականին կազմում էր 92%, այդ թվում նրբազեղմ և կիսանրբազեղմ ուղխարներին՝ մոտ 40%, իսկ, ինչպես նշվեց, նրբազեղմ ցեղերը և նրանց խառնածինները ունեն բարձր պոդատվություն։ Այդ ապացուցվում է հենց մեր ուսպուրլիկայի առաջավոր կոլտեստեսությունների փորձով, որոնք 100 մարուց ստանում են մինչև 110 ղառ։

Խոշոր եղջերավոր տնտեսուները նույնպես ունեն բարձր պաղատվություն։ Մատղաշների հիշտ աճեցման, մալրական հոտի նորմալ կերակրման և խնամքի պայմաններում յուրաքանչյուր կով կամ տնտեսական սևաական հասունության հասած էգ հորթ ընդունակ է տալն տարի սերունդ տալու։ Առանձին ղեղերիում կովերը գույգ էլ են ծնում, իսկ խառնածին կաղմակերպելու պետրում հնարավոր է լինում 100 կովից տարվա ընթացքում ստանալ մինչև 110—120 հորթ։

Վերջին տարիներում մեր երկրում յուրջ նվաճումներ են ձեռք բերվել դուղատնտեսական կենդանիների ստերջության վերացման համար։ Զգալի պայքարում։

Ներկայումս հիմնականում բացահայտված են այն պատճառները, որոնք առաջ են բերում կենդանիների նորմալ բեղունության խախտում և ստերջություն։ Այդ պատճառների վերացումն էլ հենց ստերջության վերացման վճարական լծակն է։

Շատ տարածված է այն կարծիքը, թե կովերի ստերջության միակ պատճառը միտ կերակրումը և պահպանումն է։ Այդ տեսակետը պաշտպանողների կարծիքով՝ բավական է բարելավել կենդանիների կերակրումը և պահպանման պայմանները, որպեսզի լիովին վերանա ստերջությունը։ Որ լիարժեք կերակրումը և պահպանման նորմալ պայմանները շատ կարևոր նշանակություն ունեն բարձր պոդատվություն ապահովելու և ստերջությունը խիստ կրճատելու գործում, անմիջական է, բայց չպետք է մոռանալ, որ լավ կերակրումը ստերջության ղեռ պայքարելու միակ միջոցը չէ, քանի որ կենդանիների չբեղմնավորվելու, կամ բեղմնավորվածների պտղի սաղմնային զարգացման նորմալ ընթացքի խախտման պատճառները շատ բուլմնական են։

Գրա համոզիչ ապացույցը կարող է լինել այն փաստը, որ կովերի ստերջության բարձր տոկոս է նկատվում ո՛չ միայն այն տնտեսություններում, որտեղ կերակրման պայմաններն անբավարար կամ վատ են, այլ նաև ոչ թիչ ղեկաքերում, այնպիսի տնտեսություններում, որոնք լիովին ապահովված են կերերով։ Որպես օրինակ կարելի է բերել հենց մեր ուսպուրլիկայի Լոռու տոհմային սովխուղ (կայինինուլի շրջան), որն իր արտադրական ցուցանիշների մեծ մասով մեր ուսպուրլիկայի առաջավոր անասնապահական տնտեսություններից մեկն է։ Սովխուղը լիովին ապահովված է կերերով թե՛ մամուռային արոտային, թե՛ մսուրային շրջանում։ Բայց շնայած դրան, կովերի ստերջությունը ալատեղ ղեռ շատ բարձր է և հասնում է մինչև 20%-ի։ Այդպիսի տնտեսություններում ստերջության բարձր տոկոսի պատճառներ կարող են լինել կենդանիների սևական օրգանների հիվանդությունները, նեղ-ազգակցական բուծումը (ինբրիդինգը), կենդանիների բերի ղալու մոմենտը ժամանակին չնկատելը և նրանց ժամանակին չբեղմնավորելը, արհեստական սերմնավորման ժամանակ անորակ սերմ-

նահանգուղիի օդատարործութեւնը, վիտամինների ու հանքային նյութերի պակասը մայր կենդանիների ու արտադրողների կերտաւածում և ալլին Այդպիսի դեպքերում միայն լավ կերակրելով իհարկէ հնարավոր չէ վերացնել ստերջութիւնը, անհրաժեշտ է լինում կիրառել միջոցառումների ամէլի լայն և ամբողջական կամպէնիս։ Առաջավոր տնտեսութիւնների փորձը ցույց է տալիս, որ ստերջութիւնը դեմ հաջող պայքարելու համար ամենից առաջ անհրաժեշտ է մտնարակըրկիս կերպով ուսումնասիրել և պարզել նրա տալանքման կոնկրետ պատճառները։ Այդ դեպքում է միայն հնարավոր մշակել և իրականացնել էֆեկտիւ միջոցառումները։

ԱՄՆ-ում, որտեղ, ըստ մամուլի պաշտօնական տվյալների, կովերի ստերջութիւնը տատանւում է 2,5—15%—ի սահմաններում, այդ երեւոյթի հիմնական պատճառը համարում են կովերի կերակրումը մեծաքանակ խտացրած կերերով։ Նրանց կաթնատուլիւնի ամփոփումը և բեղմնավորման ժամանակ թույլ տրվող թերութիւնները։ Քայց բանն այն է, որ ցածր մթերատուութիւն ունեցող տնտեսութիւններում ևս հաճախ կովերի ստերջութիւնի տեղիւր շատ բարձր է լինում։ Հետեւաբար, էֆեկտիւ միջոցառումներ կիրառելու համար անպայման պետք է պարզել տվյալ տնտեսութիւնի հստակ նկատուող ստերջութիւնի բարձր տեղիւր կոնկրետ պատճառները։

Ամփոփական Միութիւնում ստերջութիւնը դեմ հաջողութիւնը պայքարելու գրական փորձի բազմաթիւ օրինակներ կան։ Կանգ առնենք դրանցից միայն մեկի վրա։

Ինչպէս հաղորդում է Պ. Ա. Վստակովը, Օրենբուրգի մարզի մի շարք շրջանների կոյտնտեսութիւններում կովերի ստերջութիւնը մի քանի տարի առաջ հասնում էր 16—53%—ի։ Մարդի անասնաբուժական փորձակայանը հինգ տարվա ընթացքում այդ կոյտնտեսութիւններում անցկացրեց հետևյալ կամպէնիսային միջոցառումները։

ա) բարելավվեց տնտեսների կերակրումը, մասնավորապէս հաշվի առնելով նրանց պահանջը վիտամինների և հանքային նյութերի նկատմամբ։

բ) ձմեռային շրջանում կերտուում էր կենդանիների ամենօրյա սխտեմատիկ դրոսանք։

գ) հստի վերարտադրութիւնի պորձում սահմանվեց պլանայնութիւն, ուժեղացվեց հսկողութիւնը կովերի սեռական ցանկութիւնը գրանդման և ժամանակին բեղմնավորվելու վրա։

դ) ուշագրութիւնը դարձվեց արտադրող ցույների օգտագործման ռեժիմի և նրանց սերմնահանգուղիի որակի վրա։

զ) տոնանակի ուշագրութիւնը դարձվեց կովերի սեռական օրդանների հիմնականութիւնների բուժման վրա, օգտագործելով բուժման նորագոյն միջոցներ և մեթոդները։

է) անասնաբուժական և գոտիխնիկական հարցերին նվիրված մշտական պարտագումներն անցկացվեցին անասնապահների հետ՝ ծանոթացնելով նրանց ստերջութիւնի վերացման բնագոյնում գիտութիւն և անասնաբուժութիւնի առաջավորների ձևոր բերած նվաճումներին։

Այդ միջոցառումների հետեղական կենսագործման շնորհիւ 672 հիմնադ ստերջ կովերից բուժվեցին և իրենց վերարտադրողական բնդանակութիւնը վերականգնեցին 648-ը, կամ 97%-ը։ Այդ մարդի 9 կոյտնտեսութիւններում

ստերջութունը լրիվ մերացվեց, 8 կոլտնտեսություններում ստերջ մնացած կովերի թիվը հասցվեց մինիմումի՝ 0,7—4,5% -ի:

Նման միջոցառումներ ի վիճակի է իրականացնելու ամեն մի կոլտնտեսություն, ամեն մի սովխոզ: Բերած սյունակը ցույց է տալիս միաժամանակ, որ ստերջության դեմ կիրառվող միջոցառումները զրական արդյունք են տալիս ոչնի մասնակ, երբ նրանք իրականացվում են կոմպլեքսային եղանակով և հետևողականորեն:

Ստերջության դեմ մղվող պայքարի կարևորությունը բացատրվում է նրանով, որ ստերջության բարձր տոկոսը ոչ միայն կասեցնում է հոտի նորմալ վերարտադրությունը, այլև խիստ սևեղադառնում է կովի միջին կախնատվության վրա: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ստերջ կովի կախնատվությունը կերակրման և խնամքի նույնանման պայմաններում պակասում է 25—50% -ով: Այս թև ինչու այդքան մեծ ուշադրության է արժանի մայրական հոտի ստերջության դեմ մղվող պայքարը:

## 2. ՀՈՏԻ ԺԻՇՏ ԿԱՌՈՒՑՎԱՄԵՒ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆՐԱ ՆՈՐՄԱԼ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՀԱՐԱՐ

Հոտի ճիշտ կառուցվածքը կարևոր նշանակություն ունի նրա բնդլայնված վերարտադրությունն ապահովելու համար, առանց որի նարավոր չէ հետևողականորեն ավելացնել սեռասնաբուծական մթերքների արտադրությունը: Հոտի նորմալ վերարտադրության համար անհրաժեշտ է, որ նրա կազմում գերակշռի մայրական զխաքանակը: Մեր ուսպուբլիկայի պայմաններում կովերի տնտկարար կշիռը սալարի հոտում 40—45% -ից պակաս չպետք է լինի, իսկ քաղաքամերձ կոլտնտեսություններում և սովխոզներում այն պետք է կազմի տանվազն 50—55%, Բայց իրականում շատ կոլտնտեսություններում կովերի բունակը հոտում 25—30% -ից չի անցնում:

Լեռնային և մասամբ նախալեռնային շրջաններում խոշոր եղջերավոր անասունների հոտում բանդ կզների տոկոսը հաճախ հասնում է 20—25%-ի, որը շատ բացասաբար է անդրադառնում հոտի նորմալ կառուցվածքի վրա, խիստ իջեցնում է մայրական կազմի տնտկարար կշիռը: Գյուղատնտեսական աշխատանքների մեքենայացումը հնարավորություն է տալիս զգալիորեն կրճատելու կզների քանակը նախքան և նրանց հաշվին ավելացնելու մայրական կազմը: Մեր պայմաններում կարելի է հանձնարարել հոտի օրինակելի կառուցվածքի հետևյալ երկու մարիանտները, որոնք կարող են ճշտվել, ելնելով տնտեսության կոնկրետ պայմաններից (տե՛ս բերված աղյուսակը):

Մերձքաղաքային կոլտնտեսություններում ու սովխոզներում կովերի տնտկարար կշիռը նայատակահարմար է հասցնել մինչև 55% -ի (և ավելի), իսկ հեռավոր (խորրային) շրջաններում կարելի է 45-ից մի փոքր պակասեցնել, թույնելով 41—42%:

Լեռնապուրլիկայի կոլտնտեսություններում դեռ ցածր է նաև մաքիների տնտկարար կշիռը ոչխարների համար: Միջին տոկոսը 50—55-ից չի անցնում, այն ժամանակ, երբ հոտի նորմալ կառուցվածքի դեպքում մաքիների տոկոսը հոտում 70-ից պակաս չպետք է լինի: Հաշվարկումները ցույց են տալիս, որ եթե մաքիների բունակը հոտում ավելացվի 18—20% -ով, ապա ոչխարի մոտ

## Տուվարի և ոտի օրինակելի կոստումներ

| Անասունների սեռահասակային խումբը   | 1-ին վարիանտ՝ կո-<br>վերի տեղակարար<br>կշիռ 50 1/2-ի գեղ-<br>բում | 3-րդ վարիանտ՝<br>կովերի տեղակա-<br>րար կշիռ 50 1/2-ի<br>գեղբում |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Արագրող ցուլեր                     | 1                                                                 | 1                                                               |
| Կովեր                              | 50                                                                | 45                                                              |
| Երկնյաներ                          | 0                                                                 | 8                                                               |
| Հզ հորթներ մինչև 1 տարեկանից բարձր | 15                                                                | 11                                                              |
| Հզ հորթներ մինչև 1 տարեկան         | 12                                                                | 14                                                              |
| Ամորձատվածներ                      | 3                                                                 | 7                                                               |
| Ցուլիկներ 1 տարեկանից բարձր        | 2                                                                 | 3                                                               |
| Աուլիկներ մինչև 1 տարեկան          | 8                                                                 | 11                                                              |
| Ընդամենը                           | 100%                                                              | 100%                                                            |

տրտադրությունը միայն դրա հաշվին կալվելանա 20—25%-ով, իսկ դա նշա-  
նակում է լրացուցիչ արտադրելի մինչև 3000 և ավելի տոննա ոչխարի միս:

Ինչպես տեսնում ենք, աչտուկ ևս կան ղեռ չօգտագործված զգալի ռեզերվ-  
ներ: Եռորդն է մասնը նշված անասունների հոտի կառուցվածքում եղած թե-  
րություններն ուղղելու գնպրում հնարավոր է լրացուցիչ արտադրել մի քանի  
հազար տոննա միս և տամնյակ հազար տոննա կափ:

3. ԽՈՒՍԱՓՆԸ ՄԱՅՐԱԿԱՆ ՀՈՏԻՑ ԿԵՆԴԱՆՆԵՐԻ ՉԶՈՐԱՎՈՐՎԱԾ  
ԽՈՏԱՆՈՒՄԻՑ: ԼԱՅՆՈՐԻՆ ԿԻՐԱԹԵԼ ԽՈՇՈՐ ԵՎ ՄԱՆՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ  
ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՇԵՍՏԱԿԱՆ ՍԵՐՄԱՎՈՐՄԱՆ ՄԵՐՈՐԸ

Հոտի նորմալ վերարտադրության պայմաններում րնական ամորտիզա-  
ւիան (խոտանումը) 5—8 ր-ից չպետք է անցնի, բայց շատ հաճախ խոտանում  
են մայրական հոտի մինչև 20—25 ր-ը, ձգտելով արհեստականորեն բարձրաց-  
նել կովի միջին կաթնատվությունը: Գյուղատնտեսական կենդանիների բաղ-  
մացման և հոտի րնդվանված վերարտադրության րնագավառում, հատկապես  
Առկատական Միությունում, վերջին տարիներում ձեռք են բերվել լուրջ նվա-  
հումներ, որոնք հնարավորություններ են տալիս վերացնելու այն պատճառները,  
որոնք խախտում են կենդանիների բաղմացման ունակությունները: Ուստի ոչ  
մի մայր կենդանի, որը կարող է գնո բաղմանալ, պտպարել, չպետք է խոտա-  
նել: Մայրական հոտը պետք է պահպանել ամենայն խնամքով և խոտանում  
թույլ տալ միայն բացառիկ դեպքերում, երբ մանրակրկիտ հետազոտություն-  
ները հաստատում են, որ կենդանին իրոք որ անդառնալիորեն կօրցրել է պրա-  
դարերից: րնդունակությունը: Միաժամանակ տնտեսությունների վեկավարնե-  
րը և մասնագետները պետք է ամենալուրջ ուշադրություն դարձնեն մայրական  
հոտի համարման վրա լավ պարագայի լիարժեք մատղայների հաշվին, աշխա-  
տելով, որպեսզի ամեն մի խոտանված կովի փոխարեն լինի առնվազն 2—3  
համարող Հզ հորթներ:

Համարող (վերանորոգող) մատղայների ճիշտ աճեցումը մայրական հոտի  
համարման և րնդվանման հիմնական աղբյուրն է: Այդ նպատակի համար



Կրանք ոչևոր է առանձնացվեն զիս վաղ՝ 3—4 ամսական հասակից և զրվեն աճեցման-զատախարակման րարենսպատ պայմանների մեջ: Աճեցման հիշատիտեմի գնպրում ՍՍՌՄ-ում բուժվող ասպարի զրեթե քոլար ցեղերի հորթերն էլ 16—18 ամսական հասակից քնդունակ են բեղմնավորվիլու, պտղաբերելու և լավ դարդացած, բարձր միջնադարյան կենդանի զատնալու Այդպիսի երինքների առաջին ծինը տեղի է ունենում սովորաբար 25—27 ամսական հասակում: Բայց շատ ջրինակներ կարելի է բերել հենց մեր ուսուցիչիկայի կոտնտեսութլումներից, երբ էջ հորթերը արտադրական հոտ են փոխադրվում 3,5—4 տարեկան հասակում, իսկ երբեմն էլ տվելի ուշ: Դրականության մեջ տվյալներ են բերվում այն մասին, որ միտլյան ասանձին մարդերում առաջին անգամ ծնած հորթերի քնդհանուր քանակից 5—6 տարեկանները կազմել են մինչև 78%: Դրա պատճառն այն է, որ մատուցող կաթնային և մասնավորապես ետլաթնային շրջանում հիշատի աճեցվում, բերի զալու մոմենտին անհրաժեշտ կենդանի քաշ և զիրութլուն չի ունենում, այդպիսի կենդանիների սեռական փրարտութլյան օրգանները նալնպես նորմալ զարգացած չեն լինում: Այդ ամենի հետևանքով մեծ թվով արուների հասած հորթեր չեն բեղմնավորվում և մնում են ստերը: Հորթերի ստերը մնալու պատճառներից մեկն էլ այն է, որ նրանց հաճախ բեղմնավորում են ժամանակից շուտ՝ 14—15 ամսական հասակում, հալի շառենով նրանց քնդհանուր ֆիզիոլոգիական զարգացումը, մասնավորապես կենդանի քաշը: Բնական է, որ այդպիսի կենդանիները կամ չեն բեղմնավորվում, կամ եթե բեղմնավորվում էլ են, պտուղը մինչև վերջ չեն կարողանում զարգանել, տեղի է ունենում վիժում, իսկ եթե ծնում էլ են, ապա հորթի լինում է թերաճ, թույլ, ոչ կենսունակ:

Ատերջութլյան վերացման և հոտի տոհմային որակի րարձրացման արմատական միջոցառումներից մեկը տրհեստական սերմնավորման եղանակի լալն կիրառումն է, որ մեր ուսուցիչիկայում, զուտը սրտի, զեռ րավարար տարածում չի ստացել:

Ներկայումս ուսուցիչիկայում գործում են քնդումներ 5 պետական տոհմային և արհեստական սերմնավորման կայաններ, սրանց աշխատանքները զեռ հարկ եղած շտիով չեն ծավալվել: Անհրաժեշտ է առաջիկա մեկ-երկու տարում այդ կայանների թիվը հասցնել տոնլալն 10-ի, ապահովել նրանց անհրաժեշտ թվով րարձրալմեր տոհմային արտադրողներով, մասնադիտական կադրերով, նյութա-տեխնիկական րադայով և արանսպրտով: Աշխատանքների հիշտ կազմակերպման դեպքում արհեստական սերմնավորման կայանների այդպիսի ջանքը հնարավորութլյան կտա տրհեստական սերմնավորմամբ հիմնականում րնդգրկելու կոտնտեսութլյանների ու սովխոդների թե՛ խոշոր և թե՛ մանր կղերավոր անասունների մայրական հոտը: Արհեստական սերմնավորման մասնալական կիրառումը հնարավորութլյուն կառ առավերագույն շտիով օգտագործելու րարձրալմեր տոհմային արտադրողներին, որը կնպաստի ոչ միայն ստերջութլյան վերացմանը, այլև հոտի տոհմային կալմի րարեկալմանը: Արհեստական սերմնավորման եղանակի մասնալական կիրառումն անասնաբուժութլյան միջնադարյան րարձրացման ամենակարևոր լծակներից մեկն է և այն պետք է լալն կիրառում զանի ուսուցիչիկայի կոտնտեսութլյուններում և սովխոդներում:

#### 4. ԽՈՇՈՐ ՈՒ ԽՂԱՆՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՏՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ ԽՈՋՆԵՐԻ ՌԱՋԵՒՈՐԱԿ ԲՏՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԻՐՊՈՒՄԸ

Մսի արտադրությունն ավելացման կարևորագույն ուղղություններից մեկը, մասնավորապես մեր ռեսպուբլիկայի պայմաններում, խոշոր և մանր եղջերավոր անասունների բուծման կազմակերպումն է ամառային արտոններում, որոնց տարածությունները կազմում են ռեսպուբլիկայի ամբողջ հողատարածության մոտ  $\frac{2}{3}$ -ը: Գյուղական ուսումնասիրությունները և առաջատար կոտլտոտնությունների փորձը հաստատում են, որ անասունների բուծման ռազմական ձևով կազմակերպելու դեպքում հոտի հիշտ կամպլեկտավորումը ըստ սեռա-հասակային խմբերի ցուցիկների, խտտամիաց ջուրերի, խոշերի և խոյիկների ամորձատումը, արտոնների հերթավորումը օգտագործումը, բազմա անասունների սիստեմատիկ կլուսումները՝ օրվա քաշանը ստուգելու համար և ալլել, հնարավոր է ամառային սրտաներում, միայն ուրոսակոնաչի օգտագործման հաշվին, առանց լրացուցիչ կերակրման, ապահովել խոշոր եղջերավոր անասունների բարձր քաշան՝ օրական մինչև 1—1,2 կգ և ավելի, ոչխարներին՝ օրական քաշան՝ 140—150 գ: Այլ կերպ ասած, միայն արտոնային շրջանում՝ 110—120 օրվա ընթացքում յուրաքանչյուր խոշոր եղջերավոր անասունի կենդանի քաշը հնարավոր է ավելացնել 100 կգ-ով, իսկ մեկ ոչխարինը՝ մինչև 15 կգ-ով: Արտոնային բուծման մեծ տառիկություններից մեկն էլ այն է, որ ստացված միսը ունենում է անհամեմատ ավելի ցածր ինքնարժեք, քան խտացրած կերերով բուծված: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մսուրային բուծման ժամանակ, երբ ողատագործում են խտացրած կերեր, շոր խոտ և հյութավի կերեր, 1 կգ քաշանի վրա ծախսվում է ոչ պակաս 9—10 կերի միավոր և 1 կգ քաշանի ինքնարժեքը կազմում է ոչ պակաս 4—5 սուրյի, իսկ արտոնային բուծման ժամանակ այն 1 սուրյուց չի անցնում:

Անցյալ տարվա տնտեսային ամիսներին մեր ռեսպուբլիկայի կոտլտոտնություններն ու սովխոզները արտադրել են 20 հազար խոշոր եղջերավոր և 200 հազար մանր եղջերավոր անասուններ: Բայց այդ թվից հարելի է և պետք է գրավորեն ավելացնել, քանի որ կան անհրաժեշտ ուղղություններ, կովերի դիտարանակը կոտլտոտնությունում ու սովխոզներում առ 1/10—1/50 թվականի դրությամբ կազմում է ավելի քան 110 հազար, յուրաքանչյուր 100 կգ-ից ստացված է 85—87 հորթ, որոնց 50%-ը արտոններ են: Դա նշանակում է, որ միայն մեկ տարում ստացվող ցուլիկների քանակը կկազմի ոչ պակաս 40—45 հազար դուխ: Կոտլտոտնություններն ու սովխոզները տարեկան ստանում են մոտ 800 հազար դուխ: Մանր եղջերավոր անասունների մոտոլաշ, որոնց 50%-ը նույնպես արտոններ են: Հասակավոր ոչխարների հոտից յուրաքանչյուր տարի խտտանվում են նաև զգալի թվով ծերացած, ցածր մթերատու կենդանիներ: Այսպիսով, հնարավորություն կա յուրաքանչյուր տարի արտոնային բուծման ղնել ոչ պակաս 65—70 հազար դուխ: Խոշոր եղջերավոր և մինչև 400 հազար դուխ մանր եղջերավոր անասուններ: Բառան անհամեմատ ավելի մեծ արդյունք է տալիս, երբ ցուլիկներն ու խոտանված ցուլերը, ինչպես և խոյերն ու խոյիկները նախօրոք ամորձատվում են:

Սրանի Անասնարուծական-անասնաբուծական ինստիտուտի դոցենտ Ա. Բարբուրյանը առաջարկել է 2—4 ամսական խոյիկներին ամորձատելու նոր եղանակ՝ մակամորձիկների և ամորձիկների շարակցությամբ ամորձաչին նեղու-

կի պահպանումը: Հեռացվում է միայն ամորձիի պարունակությունը — պահանջվում են Մասնաշաղկապ փորձերը ցույց են տվել արունների ամորձատման առկա եղանակի մի շարք առավելությունները ամորձատման սովորական եղանակների նկատմամբ:

### ա. Խոշոր եղջերավոր անասունների ձմեռային բուսումը

Ընդձնելով ամառային բուսման մի շարք առավելությունները, չպետք է թիքազնադատել նաև աշնան-ձմեռային մուրաբային բուսման նշանակությունը: Զմեռային բուսումը, որպես կանոն, պետք է կազմակերպել ընտրման եղանակով, այսինքն բուսման պետք է զնել այն կենդանիներին, որոնք այս կամ այն պատճառով խոտանում են որպես մասցու-օգտագործելու նպատակով: Լեզուիսի կենդանիները պարտադիր կերպով պետք է բուսման զնել, որից նետո միայն օդատարածել որպես մասցու: Լեզու միջոցառումը հնարավորություն կտա խոտանելու միջակից ցածր որակի մասցու հանձնելուց և նկատելիորեն ափսոսանքով մոխրադրությունը: Միջակից ցածր մասցու հանձնելու հետևանքով ռեսպուբլիկայի կոլտնտեսությունները արհեստականորեն իջեցնում են մոխրադրությունը, որը միաժամանակ բարձրացնում է նրա ինքնարժեքը և զրկում քանակի ու ռազմական ծախսման պատճառ է դառնում:

Զմեռան մուրաբային շրջանում անասունների բուսումը կազմակերպելու համար 1960 թվականին ռեսպուբլիկայի բազմաթիվ կոլտնտեսություններում կան քարենպաստ պայմաններ, մասնավորապես կերի պաշարներ: Առ 1110—1959 թվականի, սեղյալ տարվա նույն ժամկետի համեմատությամբ, կոլտնտեսություններում կուտակվել է 113 հազար տոննա ափելի խոտ և մոտ 100 հազար տոննա ափելի սիլոս: Շատ կոլտնտեսություններ մուրաբային շրջանի համար ստանձնացրել են նաև բավական լանակությամբ հատիկային և այլ տեսակի խտացրած կերեր:

### բ. Միանվագ մեռունների օգտագործումը վերաբաղեցված նսլատակով

Մսի արտադրության ափելացման կարևոր ռեզերվներից է միանվագ մեռունների (ՌԱՅՈՐԱՅԻ ՆԱԾԻՄ) օգտագործումը: Առաջավոր կոլտնտեսություններն ու սովխոզներն այդ ռեզերվների հաշվին արտադրում են հարյուրավոր տոննա խոզի միս: Ռյազանի մարզի կոլտնտեսություններն ու սովխոզները 1959 թ. պետությանը վաճառեցին երեք անգամ ավելի միս, քան նախատեսված էր տարեկան պլանով: Մսի արտադրության ափելացման այդպիսի բարձր տեմպերին մեծ չափով նպաստեց միանվագ մեռունների օգտագործումը: Լեզու մարզի կոլտնտեսությունները և սովխոզները ծրագրեցին աշնան ամիսներին 35 հազար զուգա-հիմակա մեռուններից բացի բեղմնավորել նաև 100 հազար գուգա միանվագ մեռուններ, որը հնարավորություն կտա 1960 թվականի առաջին կիսամյակում ստանալ առնվազն 700 հազար խոճկոր: Լեզուիսի ստանդարտ փորձը պետք է օգտագործել նաև մեր ռեսպուբլիկայի կոլտնտեսություններում ու սովխոզներում:

### 5. ԱՄԵՆ ԿԵՐՊ ԶԱՐԳԱՅՆԵԼ ԹԻՉՆԱՐՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՈՐԸ ՄՍԻ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԿԱՐԻՎՈՐԱԳՈՒՅՆ ԱՂՔՅՈՒՐՆ Ի

Թռչնաբուծությունը անասնաբուծության ամենալուրջ և ճշգրիտ մեկն է։ Գյուղատնտեսական թռչունները՝ բազկերը, սագերը, հնդկահավերը, ինչպես նաև հավերը շատ արագ են աճում և չափազանց արժեքավոր են մսի արտադրության տեսակետից։ Բազկիկը ձվից դուրս գալու մոմենտին կշռում է ընդամենը 50 գ. իսկ արդեն երկու ամսական հասակում նրա կենդանի քաշը հասնում է 2 կգ-ի և պատրաստ է մորթի։ Բազմաթիվ առաջավոր տնտեսությունները յուրաքանչյուր բազկի մեկ տարում աճեցրած սերնդից ստանում են 100—120 կգ միս։ Այլ կերպ ասած, յուրաքանչյուր մայր-բազկ իր սերնդով տարվա ընթացքում տալիս է այնքան միս, որքան կարող են տալ երեք ոչնաբը, կամ մեկ տարեկան խոշոր եղջերավոր անասունը։ Իրենց վաղաճատության միջոցով բազկերին քիչ են վիջում նաև սագերը, հնդկահավերը և մսաձվատու ցեղերի հավերը։ Խոլմոգորյան ցեղի սագերը 3 ամսական հասակում կշռում են 4.5—5 կգ, Հավերը հինգ ամսական հասակում իրենց սկզբնական կենդանի քաշը ավելացնում են 40—50 տոկոսով։ Մսա-ձվատու ցեղերի մատղաշների կենդանի քաշը 90—100 օրական հասակում հասնում է մինչև 1.3—1.5 կգ-ի։ Տնային թռչունների արժեքավոր տնտեսական ու բիոլոգիական առանձնահատկություններից մեկն էլ այն է, որ նրանք շատ բարձր են հատուցում ծախսած կերը։ 1 կգ մսի արտադրության միայն թռչունը ծախսում է ընդամենը 3—3.5 կգ կերի միավոր, մոտ 30—35% -ով քիչ, քան ամենալուրջ և զյուզյուտն տեսակա՝ կան կենդանին խոզը։

Մսի արտադրության արագ ավելացման տեսակետից առանձնապես մեծ արդյունք է տալիս մսացու ձուների (բրոյլերների), հնդկահավերի և ջրլող թրոշունների մատղաշների աճեցումը։

Բրոյլերների աճեցումը շատ մեծ զարգացում է ստացել արտասահմանյան մի շարք երկրներում։ Մոլեխտական Միության մի շարք մարզերում և ռեսպուբլիկաներում վերջին մեկ-երկու տարում բրոյլերների աճեցումը նույնպես սկսել է զարգանալ։ Մասնաշաղկապ արտադրական փորձերը ցույց են տալիս, որ մսացու մատղաշների աճեցման այդ պրոդուկտի եղանակը լավ արդյունք է տալիս միայն այն ժամանակ, երբ այդ նպատակի համար օգտագործում են մսա-ձվատու ցեղերի մատղաշները կամ նրանց և ձվատու ցեղերի տրամախաչումից ստացված առաջին սերնդի խառնածինները։

Այդ եղանակով աճեցված և բաված մատղաշների միայն լինում է բարձրորակ և ցածր ինքնարժեք է ունենում։ Էջմիածնի չրջանի Աղավնատուն գյուղի կոյտնատնտեսության թռչնաբուծական ֆերման այս տարի բուժման զրեց մոտ 3000 ռուսական սպիտակ ցեղի մատղաշ արքայաղջիկներ։ Կավ խնամքի և կերակրման շնորհիվ արագաճող աճեցվող ղլխաքանակի պահպանման բարձր արդյունք (ապիլի բուն 97 %) և բարձր քաշաճւ 90—95 օրական հասակում արքայաղջիկների կենդանի քաշը կազմեց մոտ 1 կգ, իսկ 1 կգ մսի (կենդանի քաշը) ինքնարժեքը՝ ընդամենը 5 օտր. 50 կոպ.։ Բարձր արդյունք է տալիս վերջին տարիները Հայաստանում ստեղծված նոր ցեղային խմբի հավերի (մսա-ձվատու ուղղության) ու ռուսական սպիտակ ցեղի հավերի արդյունաբերական տրամախաչումից ստացված առաջին սերնդի խառնածինների մատղաշների բը-



տումբը էջմիածինի թղչնարտածական ֆաբրիկայում բոմբան են դնում հիմնականում ալյուրիսի խառնածին մատղաշները Անցյալ տարի այդ ֆաբրիկան պետությանը հանձնեց՝ 560 ցենտներ թուղունի միս—երկու անգամ ավելի քան 1957 թ.

### Հատուկ ուշադրություն սագարությունը զարգացմանը

Մեր ուսպուրիկայում, բնական արտաների մեծ տարածությունների առկայության շնորհիվ, առանձնապես նպաստավոր պայմաններ կան սագարությունների զարգացման համար, քանի որ սագերը հիմնականում արտադրվում են և դրեթի առանց լրացուցիչ խտացրած կերեր օգտագործելու, միայն արտականաչի հաշվին լայն բաժնով են և, ինչպես նշվեց, արդեն 3 ամսական հասակում ունենում են 4,5—5,5 կգ կենդանի քաշ։ Արտադրվող պայմաններում աճեցրած սագի միսն ունենում է շատ ցածր խոֆնորժեքը։ Լինինականի թղչնարտածական ֆաբրիկայում Արիի լճի սագարածական ֆաբրիկայում անցյալ տարի աճեցվել է մոտ 1000 սագ և 1 կգ մսի խոֆնորժեքը կազմել է րեզումենը 5 ռուբլի։

Ռեսպուրիկայի միայն լեռնային և նախալեռնային շրջանների կոլտնտեսությունները հնարավորություն ունեն պահելու ոչ պակաս 100 հազար մայր-սագ և տարեկան աճեցնել արտականաչի հաշվին ոչ պակաս 500 հազար սագ, իսկ դա նշանակում է՝ լրացուցիչ արտադրել մինչև 2,5 հազար տոննա թուղունի միս։ Ռեսպուրիկայի ցածրագիր և մի շարք նախալեռնային շրջաններում պարզացման մեծ հեռանկարներ ունի նաև հնդկահավաբուծությունը, իսկ լճակներում և ջրավազաններում հարուստ շրջաններում՝ նաև բուսաբուծությունը։

Ցոխնամյակում թուղունի մսի տեսակարար կշիռը մսի համախառն արտադրանքի մեջ պետք է կազմի ոչ պակաս 14—15%, իսկ ներկայումս մեր ռեսպուրիկայում հազիվ 1—2% է կազմում։ Թուղունի մսի արտադրանքը մեղ մոտ պետք է ամեն կերպ ավելացնել, դրա համար կան նպաստավոր պայմաններ։

### 6. ՌԱՅԻՌՆԱԿԻ ԿԵՐՊՈՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՆԵԼ ՎԵՐԱՄԵՇԱԿՎՈՂ ԱՐԿՅՈՒՆԱՐԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵԱՑՈՒԿՆԵՐԸ, ՈՐՊԻՍ ԷԺԱՆ ԿԵՐԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ԱՂՐՅՈՒՐ

Հաշտատանում լայն դարպասում է առաջել դյուդատնտեսական հումք վերամշակող արդյունաբերությունը, որի մի շարք հյուղերից ստացվող մնացուկներն արժեքավոր և էժան կերերի աղբյուր են հանդիսանում։ Դրանց թվին են պատկանում շաքարի ճակնդեղի մուգը, պարեջրի արդյունաբերության մնացուկը՝ բարդան, խաղողի վերամշակման մնացուկը՝ մզվածքը, կաթի վերամշակման մնացուկները, սպանդանոցային մնացուկները՝ (ուրյան և մսառսկրային ալյուրը), բոժոժի վերամշակման մնացուկները՝ շերամի որդի հարսնյակները, ձկնարդյունաբերության մնացուկները՝ ձկան ալյուրը, պահածոների արդյունաբերության մնացուկները՝ պոմիդորի կորիկները և մզվածքի մնացուկները և այլն։

Կերերի այդ լրացուցիչ աղբյուրների ուսցիման օգտագործումը հնարավորություն կտա բոմբան ղեկ հազարավոր դուխ անասուններ և թղչններ։ Լեհհրածեղտ է հատուկ ուշադրություն դարձնել խաղողի մզվածքի օգտագործման վրա։ Մեր կատարած ուսումնասիրությունները ցույց տվին, որ խա-

ղողի կորիզը իր աննդարարությամբ դրեթև չի գիշում հատիկային կերերին, իսկ այդ մնացուկից մեր ուսպուրիկայի խաղողագործական շրջաններում աարեկան ստացվում է մի քանի տոտնյակ հազար տոննա, քանի որ դրանց կազմում են վերամշակվող խաղողի մոտ 25% -ը: Խոզերի և թռչունների համար խաղողի մզվածքը արժեքավոր և ըստ էության ձրի կեր է: Մեկ տոննա խաղողի վերամշակումից ստացվում է ալիկի քան 200 կգ մզվածք և 10—50 կգ դրոժներ, 1 կգ մզվածքը պարունակում է 330 գ ջուր և զանազան հյութեր և 670 գ շոր նյութ: Օդաչոր մզվածքի 33% -ը կազմում են կորիզներ, իսկ 51% -ը՝ վեղեղատուի մնացորդները: Խոզերը օրական տառմ են մինչև 3—4 կգ խաղողի մզվածք, իսկ թռչունները՝ 25—30 գ Փորձերը ցույց տվեցին, որ հավերի կերարածնում հատիկային կերերի 50% -ը խաղողի կորիզով փոխարինելու դեպքում լիովին պահպանվում է նրանց մթերատվությունը: Մակարդակը: Էժան կերի այդ պայմաններ խնամքով և ուսցիտնալ օգտագործելու: Դեպքում կարելի է մի քանի հազար տոննա լրացուցիչ խոզի ու թռչունի միս և մեծ քանակությամբ ձու ստանալ:

Կարժեք սպիտակուղի հարուստ աղբյուր են հանդիսանում շերամի որդի հարսնյակները, հատկապես թռչունների համար: Մեկ կիտոգրամ հարսնյակների պարունակում են 600 գ մարսելի պրոտեին: Աժան հավերի կերարածնում օրական 8—10 գ հարսնյակների ավելացումը 15—20% -ով ավելացնում է նրանց ձվատվությունը: Բավականաչափ տարածված է այն կարծիքը, որ շերամի որդի հարսնյակների օգտագործումը որպես կեր ահա՛ համ և հոտ է հազորդում թռչունների մսին և ձվին: Այդ ճիշտ է միայն այն դեպքում, երբ թռչունները կերակրվում են զխավորապես այդ կերով, օգտագործելով օրական 25—30 գ (չոր վիճակում), բայց երբ այդ շերամի որդի հարսնյակները տրվում են մշուս հատիկա-ալյուրային և այլ կերերի հետ միասին, օրական 10—12 գ-ի բաժանմաներում, ոչ մի ահա՛ հոտ կամ համ մսին կամ ձվին չի հաղորդվում, ոտացած մթերքները ոչնչով չեն տարբերվում ալյուրային կեր շատացած թռչունների մթերքներից: Այդ լիովին հաստատվեց Հայկական ՍՍԽ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտում և Էշմիածնի թռչնարուժական ֆարքիկայում մեր դրած փորձերով:

Հանրահայտ է, որ կաթի վերամշակման մնացուկները, ինչպես, օրինակ, շիճուկը, հիանալի կեր է խոզերի համար, բայց մինչև հիմա էլ այդ արժեքավոր մնացորդների զգալի մասը որպես կեր չի օգտագործվում և անտեղի կորչում է: Նույնը կարելի է ասել պահածոների արդյունաբերության մնացորդների մասին:

Արդյունաբերության բոլոր արժեքավոր մնացուկները պետք է խնամքով պահպանել կորստից և որպես լրացուցիչ կերի աղբյուր օգտագործել անասնաբուժության մեջ:

## 7. ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱՃՈՒՄՆԵՐԸ Ի ՍՊԱՍ ԴՆԵՆ ԱՆԱՄԱՐՈՒԾՈՒԹՅԱՆ ՉԱՐԳԱՑՄԱՆԸ ԵՎ ՆՐԱ ՄԹԵՐԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՉՐԱՅՄԱՆԸ

### ա. Կենդանիների օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական խրանումը

Դյուրատնտեսական կենդանիների և թռչունների վերաբուրադրական ֆունկցիայի ակտիվացման ու նրանց մթերատվության բարձրացման գործում մեծ դեր ունի օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական խթանումը, այլ կերպ ասած՝ զյուզատրոտնական կենդանիների պոտենցիալ ունակությունների մաքսիմալ օգտու-

գործումը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ օրգանիզմի շատ սխալները սովորական պայմաններում զործում են իրենց պոտենցիալի մոտավորապես մեկ երրորդի սահմաններում: Այս փաստը խոսում է այն լուրջ ուղերվների մասին, որոնք կարող են գործի դրվել օրգանիզմի վրա նպատակադիր ներգործելու, նրա համապատասխան սխտեմների ֆիզիոլոգիական ֆունկցիան խթանելու միջոցով:

Եի շարք փորձերով հաստատված է, որ ֆիզիոլոգիական խթանման հիմքում ընկած է օրգանիզմի նյութափոխանակության փոփոխումը, որի հետևանքով ասիմիլյացիոն պրոցեսները գերակշռում են ղեկավարվողին պրոցեսների նկատմամբ, ընդ որում յուրաքանչյուր խիմիկ, բաղի սպիլիֆիկ ներգործությունից այս կամ այն օրգանի կամ սխտեմի վրա, սուսադադնում է նաև ամրոգրական օրգանիզմի ռիտմոնուսի ակտիվացում, քանի որ յուրաքանչյուր խթանում ինչ-որ չափով միշտ էլ շոշափում է ներքոհիմքում կարգավորման բոլոր օգակները՝ օրգանիզմում տեղի ունեցող ֆիզիոլոգիական պրոցեսների ակտիվացման խմաստով:

Քալիկանաչափ լայն տարածում ստացած խթանիչներից կարելի է նշել ЛСВ (лечебная сыворотка беленского) պրեպարատը, որն իրենից ներկայացնում է մորիս տափարի չափազանց թույլ դեպոսիցիալի ներարկված արյան շրջուկը:

Փորձերը ցույց են տվել, որ այդ բուժաշիճուկի պարենտերալ ներարկման ղեկարում կենդանիների օրգանիզմում բարձրանում է ինչպես ընդհանուր, այնպես էլ, մասնավորապես, սալիտակուցային նյութափոխանակությունը:

Այդ բուժաշիճուկի ռզտագործումը դրական արդյունք է տալիս մասնավորապես կենդանիների բոտումը խթանելու տեսակետից, խոզերի վրա դրված փորձերը ցույց տվին, որ փորձնական խմբի կենդանիները 1 կգ քաշի վրա ձախսում են 5,4 կերի միավոր, իսկ կոնտրոլ խմբի կենդանիները՝ 6,1 կերի միավորով ավելի:

Խոշոր եղջերավոր անասունների բոտման ժամանակ ЛСВ պրեպարատով մշակած փորձնական խմբի կենդանիների օրական միջին քաշը 107 օրվա ընթացքում կազմեց 635 գ, իսկ կոնտրոլ խմբի կենդանիներինը՝ 563 գ: 1 կգ քաշի վրա փորձնական խմբում ծախսվել է 7,9 կգ կերի միավոր, իսկ կոնտրոլ խմբում՝ 9,0 կերի միավոր: Միաժամանակ փորձնական խմբում 2,5 և ավելի քան 1 մսի ելը, որ առանձնապես կարևոր նշանակություն ունի:

Ակադ. Ն. Գ. Բելենկու առաջարկած այդ պրեպարատը դրական արդյունք է տալիս նաև կենդանիների սեռական ֆունկցիայի խթանման տեսակետից, այն նկատելիորեն բարձրացնում է արտադրողների սեռական ակտիվությունը և միաժամանակ նպաստում է նրանց սերմնահեղուկի քանակի ավելացմանն ու սրականան գուցանիչների բարելավմանը:

Առանձնապես ցայտուն կերպով է դրսևորվում այդ խթանիչի դրական ներգործությունը, երբ ներարկվում է սեռական հաժր ակտիվություն ունեցող և վատորակ սերմնահեղուկ տվող արտադրողներին: Այդպիսի արտադրող-խոյներին 2—3 ներարկում կատարելուց հետո (կգ կենդանի քաշին 2 մլ հաշվով) նկատելիորեն բարելավվում է նրանց սեռական ակտիվությունը և սերմի օրակը:

Այդ պրեպարատը միաժամանակ խթանում է նաև էգ կենդանիների սեռական ֆունկցիան:



Ստեղծ մնացող կովերի վրա կատարած փորձերը ցույց տվին, որ ՄԵԵ-ով մշակելուց հետո բոլոր ստեղծ կովերը (բացառությամբ 1-ի) նորից բերի եկան, այն ժամանակ, երբ ստուգիչ խմբում, կերակրման և խնամքի համապար ԿԿԿ-մաններում, կովերի 50%-ը բերի չեկավ:

Արտադրության մեջ իր համար հաջողությամբ ճանապարհ է հարթում ոչխարների բազմապատկությունը խթանող հորմոնալ մեթոդը, որն առաջարկել է Գրիգորյան Մ. Մ. Զավադովսկին: Որպես խթանիչ հորմոն նա առաջարկել է Գրիգորյանի արյան շիճուկը, որին տրվել է ՇՅՅ (сыворотка жеребой кобылы) անունը: 1 լիտր արյան շիճուկով կարելի է ներարկել 100 մաքի (յուրաքանչյուրին 1200 մկնային միավոր): Դեռ 1942—1943 թթ. ՇՅՅ-ով ՍՍՌՄ-ում մշակվեց մեկ միլիոն ոչխար:

Մասսայական փորձերը ցույց են տվել, որ այն ոչխարները, որոնք մշակվում են այդ խթանիչով և բեղմնավորվում են առաջին սերմնավորման ժամանակ, մեկ ծնից տալիս են 160—180%, իսկ երբեմն մինչև 200% գառ:

Առաջին սերմնավորման ժամանակ բեղմնավորված ոչխարների մոտ 50%-ը կարող են զուգահեռ ծնել, մաքիների 8%-ը տալիս է երեքական գառ, իսկ մոտ 2%-ը՝ չորս և նույնիսկ հինգ գառ:

Կարակուլյան ցեղի ոչխարներին թուրքմենական, ուզբեկական, ղազախական և ուկրաինական ղեկավարիչականների մի շարք սովխոզներում ու կոլտնտեսություններում ՇՅՅ-ով մշակելու շնորհիվ, գառների ելը 100 մաքուց կազմեց 161-ից մինչև 204 գլուխ: Փորձերը միաժամանակ ցույց են տվել, որ մաքիների բազմապատկությունը հորմոնալ պրեպարատի ազդեցության տակ շարունակվում է 3—4 տարի:

Այդ պրեպարատի փորձարկումը մեր ղեկավարիչական մի քանի տնտեսություններում առաջին անգամ ձեռնարկվել է այս տարվանից: ՇՅՅ-ն ավելի քան 20 տարվա ընթացքում օգտագործվել է երկրի զանազան շրջաններում և մարզերում, բայց արդյունքները միշտ չէ, որ միանման են եղել, ոչ բոլոր դեպքերում է այդ խթանիչը դրական արդյունք տվել: Ուստի պետք է նկատի ունենալ, որ ֆիզիոլոգիական խթանումը դրական արդյունք է տալիս միայն այն դեպքում, երբ կիրառվում է միջոցառումների ամբողջական կոմպլեքս՝ մայրական հոտի և արտադրողների ճիշտ կերակրում, նորմալ խնամք, սերմնավորման տեխնիկայի կատարելագործում, կենդանիների սեռական օրգանների պրոֆիլակտիկա, բուժում և այլն:

Մեր կարծիքով, այդ խթանիչը մեծ հեռանկարներ ունի և պետք է նախօրոք մշակված ծրագրով լայնորեն փորձարկվի նաև մեր ղեկավարիչական կոլտնտեսություններում և սովխոզներում:

**բ. Արհեստական լուսավորության օգտագործումը թռչունների վերատադրական ֆունկցիան և մերատվությունը խթանելու նպատակով**

Երկարատև ուսումնասիրություններով հաստատված է, որ թռչունների սեռական ֆունկցիան խթանող ամենահզոր գործոններից մեկը լույսն է—լուսային օրվա տևողությունը: Ապացուցված է, որ երբ լուսային օրվա տևողությունը 12—13 ժամից պակաս է լինում, նկատելիորեն իջնում է հավերի և մյուս տնային թռչունների ձվատվությունը, և, ընդհակառակը, երբ լուսային օրվա տևողությունը աշնան-ձմեռային կարճ օրերին արհեստական լուսավորության (էլեկտրական լույսի) միջոցով երկարացվում և հասցվում է



մինչև 14—15 ժամի, նկատելիորեն բարձրանում է նրանց թե՛ աշնան-ձմեռային և թե՛ տարեկան մթերատվությունը: Մեր լաբորատորիայում, ինչպես նաև արտադրության պայմաններում կատարած երկարամյա փորձերը հաստատել են, որ լրացուցիչ լուսավորության օգտագործման շնորհիվ, կերակրման և պահվածքի հավասար պայմաններում, հավերի տարեկան ձվատվությունն ավելանում է 20—25% -ով: Ներկայումս ֆիզիոլոգիական այդ խթանիչը մեր ռեսպուբլիկայի կոլտնտեսություններում ու սովխոզներում բավականաչափ լայն տարածում է ստացել, բայց դեռ փոքր չէ նաև այնպիսի կոլտնտեսությունների թիվը, որոնք լրիվ չեն օգտագործում զոոտեխնիկական միջոցառումների կոմպլեքսի մեջ մտնող այդ կարևոր օղակը՝ տնային թռչունների մթերատվությունը բարձրացնելու համար: Ժամանակն է, որպեսզի մեր ռեսպուբլիկայում չլինի ոչ մի թռչնաբուծական տնտեսություն, որը չօգտագործի թռչնաբուծության մթերատվության բարձրացման այդ էժան, մատչելի և էֆեկտավոր միջոցառումը:

**գ. Հետերոզիսի («հիբրիդային ուժի») օգտագործումը գյուղատնտեսական կենդանիների և թռչունների մթերատվությունը բարձրացնելու նպատակով**

Զարգացնելով Դարվինի ընդհանրացումները տրամախաչման օգտակարության, և տեական նեղ-ազգակցական բուծման վնասակարության մասին, միջուրինյան գիտությունը մշակեց օրգանիզմի կենսականության մասին մի ամբողջական ուսմունք, որը լայն ասպարեզ բացեց հայտնաբերած օրինաչափությունների և մասնավորապես հետերոզիսի պրակտիկ օգտագործման համար:

Անասնաբուծության մեջ օգտագործվում են տրամախաչումների տարբեր եղանակներ նայած թե ինչպիսի՝ նպատակ է հետապնդվում: Վերջին տարիները լայն տարածում է ստացել (մասնավորապես խոզաբուծության և թռչնաբուծության մեջ) արդյունաբերական տրամախաչման եղանակը, որը կիրառվում է ապրանքային ֆերմաներում:

Այդ եղանակի էությունն այն է, որ տարբեր ցեղերի կենդանիները կամ թռչունները տրամախաչվում են միմյանց հետ, սահմանափակվելով միայն առաջին սերնդի ( $F_1$ ) խառնածիններ ստանալով: Այդպիսի խառնածինների մոտ շատ ուժեղ կերպով է զրսևորվում հետերոզիսի երևույթը — «հիբրիդային ուժը»: Նրանք օժտված են լինում բարձր կենսունակությամբ, արագ և փարթամ են աճում, ունենում են ավելի բարձր մթերատվություն և լավ են հատուցում կերերը: Տրամախաչման այդ եղանակը առավել լայն տարածում է ստացել թռչնաբուծության մեջ: Սովորաբար տրամախաչվում են մսա-ձվատու ցեղերի թռչունները ձվատու ցեղերի հետ: Փորձերը ցույց են տվել, որ բացի տրամախաչվող ցեղերի ճիշտ ընտրությունից (զուգորդումից), բարձր արդյունք ստանալու համար կարևոր նշանակություն ունի նաև սեռերի ընտրությունը: Սովորաբար մսա-ձվատու, ծանր քաշ ունեցող ցեղերից ընտրվում է աքաղաղը, իսկ ձվատու, թեթև քաշ ունեցող ցեղերից՝ հավը: Բայց առանձին փորձեր ցույց են տալիս, որ որոշ ցեղային զուգորդումների ժամանակ ավելի բարձր էֆեկտ է ստացվում, երբ աքաղաղն է ընտրվում ձվատու ցեղից: Հայաստանում մեր կողմից թռչունների արդյունաբերական տրամախաչման փորձեր ղրվեցին դեռ 1953 թվականից սկսած: Վերջին 3 տարում այդ փորձերի արդյունքները ներդրվեցին արտադրության մեջ՝ էջմիածնի թռչնաբուծական ֆաբրիկայում: Տրա-

մասնաշվույթում են երևանյան նոր ցեղային (սմբի արադադները (մաս-ձվառու ուղղություն) ուսումնական սպիտակ ցեղի (ձվատու ուղղություն) հավերի հետ: Այդպիսի տրամախառնումից ստացված առաջին սերնդի խառնածինների տարական միջին ձվատվությունը 1957—1958 թթ. կազմեց 180,1 ձու, գերազանցելով սառնդիչ հոտում սպիտակ ուսումնական ցեղի հավերի ձվատվությանը (164,8 ձու) 15% -ով: Կենդանի քաշով խառնածինները զերազանցեցին սպիտակ ուսումնական ցեղի հավերին 18% -ով: Այդպիսի տրամախառնումից ստացված խառնածինները արդեն չեն ընկնում նաև իրենց բարձր կենսաունակությամբ և ավելի լավ են հասնում կերերը: Լեռնասարսուռության և թռչնարությունության միջնադասության յարձրացման այս էֆեկտավոր միջոցառումը ևս պետք է բացնորեն կիրառել մեր ուսպուրիկայի ապրանքային ֆերմաներում:

#### II. Ճարպի տոկոսի բարձրացումը կաթի մեջ անասնաբուծության ամենաակտիվ պրոդուկտների մեկն է և նրա մրհատությունը բարձրացման լուրջ սեղանը

Այդ պրոդուկտի լուծումը մինչև օրս էլ ընթանում է հիմնականում երկու ուղիով: Առաջին ուղին նպատակ ունի ստեղծել տավարի այնպիսի ցեղեր, որոնց կաթը ունենա բարձր ճարպապարունակություն (5—6%) և այդ հատկությունը լինի ժառանգական. կայուն կերպով հաղորդվի սերունդներին: Երկրորդ ուղի նպատակն է ճարպի տոկոսը կաթի մեջ բարձրացնել ճիշտ կերակրման, զոոհիգիենական և այլ միջոցառումների միջոցով: Այդ երկու ուղիներն էլ ուշադրության արժանի են և ունեն մեծ հեռանկարներ: Գիշտ է, առաջին ուղին օգտահանում է ավելի երկար ժամանակ, բայց նրա նշանակությունը ժամար է դերազնահատել: Վերջին 5—6 տարում այդ ուղղությամբ շատ հետաքրքրական և խոստումնալից աշխատանքներ են կատարվում ՍՍՌԽ Գյուղատնտեսության նախարարության Գենետիկայի ինստիտուտի Գորկի լենինսկիէ Լքսպերիմենտալ տնտեսությունում, ակադ. Տ. Դ. Լիսենկոյի ղեկավարությամբ:

Կիրառելով բարձր ճարպապարունությամբ կաթ տվող ջերգեյական ցեղի արտադրողների ու ցածր ճարպայնությամբ, բայց մեծ քանակի կաթ տվող տարրեր ցեղերի կովերի տրամախառնման և նպատակաուղղված դասախառնուման հատուկ մեթոդներ, այդ տնտեսությունում արդեն ստեղծվել է կենդանիների մի ամբողջ հոտ, որոնց կաթը պարունակում է միջինը 5,15% ճարպ, այն ժամանակ, երբ ջերգեյական արտադրողների հետ տրամախառնվող կովերի կաթի մեջ ճարպի պարունակությունը կազմում է մոտ 3,5%: Լեռնայի հետաքրքրական է այն փաստը, որ բարձր ճարպապարունակություն (5% և ավելի) ունի ոչ միայն կիսարյուն (առաջին սերնդի) խառնածինների կաթը, այլև 1/4 արյուն (ջերգեյական ցեղի զծով) ունեցող խառնածիններին:

ՍՍՌԽ տարրեր մարզերի մի շարք սովխոզներում նույնպես սովորական նպատակով տրամախառնվել են ջերգեյական ցեղի արտադրողները կաթի մեջ ճարպի ցածր տոկոս ունեցող ցեղերի հետ: Բայց բոլոր այդ տնտեսություններում էլ առաջին սերնդի խառնածինների կաթի ճարպապարունակությունը 4,3—4,4%-ից չի անցել:

Գորկի լենինսկիէ Լքսպերիմենտալ տնտեսություններում ձևաբերված նվաճումն ունի ոչ միայն կարևոր պրակտիկ նշանակություն. ստավել մեծ է նրա նշանակությունը բիոլոգիական գիտության և, մասնավորապես, բիոլոգիական տեսակի կյանքի օրենքի տեսության հետազոտարգուման տեսականից:

Պատահական չէ, որ «Պրոսպեկտ» թերթը ապրիլի 10-ին հրատարակած հիտուրիայի նվաճումներին և «Բոտանիկական ժուռնալին» կեղծ գիրքավորումներին նվիրված իր 1958 թվականի դեկտեմբերի 14-ի խմբագրական հոդվածում անդրադառնալով կաթի մեջ ճարպի պարունակության ավելացման ուղղությամբ ահադ. Տ. Դ. Լիսենկոյի ղեկավարությամբ տարվող աշխատանքներին, նշում է, որ Լաւնպիսի արդյունքներ, լինչպիսիք ստացվել են «Կուրկի լենինսկիե» ֆերմայում, աշխատելու ղեկ ոչ ոք չի ստացել» (ընդգծումը մերն է Ս. Կ.):

Հայկական ՍՍՏ ԳԱ Ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտի գյուղատնտեսական կենդանիների ֆիզիոլոգիայի լաբորատորիայում մեր և մեր աշխատակիցների կողմից հետազոտություններ են տարվում Հայաստանում բուծվող տավարի կաթի ճարպայնության բարձրացման և ճարպագոյացման ֆիզիոլոգիական մեխանիզմների ուսումնասիրության ուղղությամբ: Ստացված նախնական տվյալները բավականին խոստումնալից են:

### Է. Կարի ճարպապարունակությունը բարձրացնելու մի նոր եղանակի մասին

Վերջին երկու տարվա ընթացքում, երկրի տարբեր շրջաններում, լայն արտադրական ստուգում է անցնում կաթնաճարպի ավելացման այդ նոր եղանակը: Ներկայումս տալացուցված է համարվում, որ երբ կովերին հիմնական կերաքանից դուրս երեք օրվա ընթացքում տրվում է օրական 3,3 լիտր թարմ դարեչրի դրոժներ հեղուկ վիճակում (ընդամենը 3 օրում 10 լիտր), ապա նրանց կաթի մեջ ճարպի քանակը բարձրանում է 0,43% -ից մինչև 0,71% (միջինը 0,4%) : Գարպի աչպիսի բարձր տոկոսը կաթի մեջ պահպանվում է մինչև 1,5 ամիս, իսկ երբեմն էլ ավելի երկար: Դրոժներով կերակրելը նորից ևս վերջնականում, երբ ճարպի տոկոսը կաթի մեջ սկսում է պակասել:

Դրոժների ներդրածության ֆիզիոլոգիական մեխանիզմը հետևյալն է: Ինչպես ներկայումս տալացուցված է, ճարպաթթուների անմիջական նախորդը, ճարպադոյացման մասնակ, հանդիսանում է քացախաթթուն: Բայց կաթնաճարպը բաղկացած է ոչ միայն ճարպաթթուներից, այլ նաև դիեղերից, ուստի ճարպադոյացումը խթանելու համար պետք է նպաստել, որպեսզի կենդանու օրգանիզմում ավելի մեծ քանակով գոյանան ոչ միայն ճարպաթթուներ, այլ նաև գլիցերին: Դարեչրային դրոժները հենց այդ գերն էլ կատարում են, երբ թափանցում են կենդանու նախաստամոքսը և այնտեղ ուժեղացնում սպիրտային խմորումները: Սպիրտային խմորումների հետևանքով ստաջանում է էթիլալին սպիրտ, որը ներծծվելով արյան մեջ, օրգանիզմի ցուամածրներում վերածվում քացախաթթվի: Սպիրտային խմորումները միաժամանակ առաջացնում են միջանկյալ պրոդուկտներ (տրիպոֆոսֆորալին թթուներ), որոնք պիտեղների պոչացման աղբյուր են հանդիսանում: Այսպիսով, դրոժների ներդրածության շնորհիվ օրգանիզմում համեմատաբար ավելի շատ քանակով են առաջանում ճարպի սինթեզի համար անհրաժեշտ երկու երկկտային նյութերն էլ, որոնք և խթանում են ճարպի տոկոսի ավելացումը կաթի մեջ:

Մեր ռեսպուբլիկայի կոլտնտեսությունները և սովխոզները պետք է լայնորեն օգտագործեն կաթի մեջ ճարպի տոկոսի բարձրացման այս էֆեկտավոր միջոցառումը:



## 8. ԼԱՅՆՈՐԻՆ ՏԱՐԱԾՆԸ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԿՆՆԴԱՆԻՆՈՐԻ ՊԱՀՎԱԾՔԻ ԱՌԱՋԱՎՈՐ ԵՂԱՆԱԿՆՈՐԸ

Որկրի առաջադրու անասնապահները վերջին շրջանում անասունների պահվածքի լավագույնը էֆեկտավոր եղանակներ են կիրառում: Այդ հարցերին մեծ ուշադրություն նվիրեց ՍՄԿՊ Գեկտեմբերյան պլենումը (1959): Բարձր արդյունք է տալիս, որինակ, տավարի արծակ պահվածքը: Այդ հղանակի ոգտագործման դեպքում 25—30 տոկավելանում է շենքերի տարադոթյունը, գոտալիորեն կրնատվում է բանվորական ուժը, իջնում է մթերքների ինքնարժեքը, իսկ մատղաշները ավելի լավ են աճում (դա հանտատված է նաև մեր ռեսպուբլիկայում (Վեդու շրջան) Ա. Գ. Որիցյանի կողմից արված փորձերով):

Առանձնապես մեծ խրախուսանքի, Գեկտեմբերյան պլենումում, արժանաքավ տաղանդավոր նորարար Սոցիալիստական Աշխատանքի Հերոս Յուրույով Չիժի արտադրական փորձը: Կիրառելով խոզերին մեծ խմբերով, աղտուտանց վանդակների պահելու եղանակը նրան հաջողվեց նույն շենքում հինգ տնկում ավելի խոզ պահել: 20 տնկում բարձրացնել աշխատանքի արտադրողականությունը և մի քանի անգամ կրճատել մսի ինքնարժեքը: Խոզերի կերակրման պարզ մեթոդներ ոգտագործելու շնորհիվ Յա. Չիժը հասավ այն բանին, որ 1 կգ քաշաճի վրա 6,6 կերի միավորի փոխարեն ծախսվում է 4,3 կերի միավոր: Մեծ արդյունք է տալիս ոչխարների խտացրած ծնի և վաղ (ձմեռային) ծնի կազմակերպումը: Այդ ուղղությամբ դրական արդյունք կա նաև մեր ռեսպուբլիկայում:

Մենք կանգ առանք անասնաբուժության մթերատվության բարձրացման միայն մի բանի կարևոր ռեզերվների վրա: Համոզված ենք, որ դրանց ճիշտ ոգտագործումը կնպաստի մեր ռեսպուբլիկայի կուտակաւսություններում ու սովխոզներում անասնապահության հետագա զարգացման և անասնաբուժական մթերքների արտադրության հետագա ավելացման գործին:

Հաղեկան ՍՍՏ ԳԱ Լ. Ա. Որերկու անվան  
Ֆիզիոլոգիաի ինստիտուտ