

Г. А. АРУТЮНЯН

НОВЫЕ ВИДЫ ЛИСТОВЕРТОК (LEPIDOPTERA, TORTRICIDAE) ДЛЯ ФАУНЫ АРМЯНСКОЙ ССР

Фауна бабочек-листоверток на древесных и кустарниковых породах в Армении изучена очень слабо, а лесные районы остаются в этом отношении белым пятном.

Массовые виды листоверток наносят в Армении значительный вред, главным образом лесному хозяйству.

Во время нашего обследования (1964—1970 гг.) декоративных насаждений городов Ереван, Ленинакан, Кировакан, Дилижан, Севан и частично лесов центральной и северной Армении на представителях 44-х родов древесных и кустарниковых растений нами выявлено 49 видов листоверток, из коих 18 видов не отмеченных до этого в составе энтомофауны Армении. Часть из них уже опубликована [1, 2], остальные виды приводятся ниже.

Бабочки определены В. И. Кузнецовым (ЗИН АН СССР) и Ю. А. Костюком (Институт зоологии АН УССР).

1. *Acleris ariciana* Hb. Повреждает распускающиеся почки, бутоны, листья шиповника (*Rosa spinosissima* L.). Гусеницы встречаются с июня до конца июля. Окукление гусениц в середине августа в свернутых листьях. Вылет бабочек отмечался (в лаборатории) 19—22.IX.1966 г. По данным Кузнецова [5], гусеницы этого вида питаются листьями ивы. Распространена в бассейне оз. Севан.

2. *Acleris cristana* Den. et Schiff. Гусеницы этого вида нами найдены в Кироваканском дендропарке на яблоне в июне (18.VI.) 1964 г. Окуклились в свернутых листьях 2—8.VII.1964, через 17 дней вылетели бабочки. Гусеницы этого вида были обнаружены также в Гехарде (Абовянский р-н) на магалепской вишне (Е. К. Ертевцян).

По литературным данным [3], указывается на иве, березе, грабе, вязе, черемухе и шиповнике.

3. *Acleris парaea* Meug. В Ереванском ботаническом саду гусеницы незначительно вредят ивам. В условиях Еревана в год дает два поколения. Гусеницы первого поколения собраны в середине мая (15.V) 1964 г., окукление—18—20.VI, вылет бабочек 1—3.VII. Гусеницы второго поколения собраны в середине августа (15.VIII) 1964, окукление 1—10.IX. 1964, вылет бабочек—29.IX 1964 г. Костюком [4] отмечен для Армении в 1966 г.

4. *Accleris scabrana* Schiff. Гусеницы летом скелетируют и выгрызают листья различных видов шиповника. Окукливаются между листьями в середине августа, вылет бабочек отмечался в конце сентября.

Распространена в бассейне оз. Севан.

5. *Accleris schalleriana* L. Гусеницы этого вида найдены нами в лесу на гордовине (Красносельский р-н, с. Артаниш, 3.VIII.1966 г.). Окукление в свернутых листьях в середине августа, вылет бабочек в конце августа.

6. *Accleris variegana* Den. et Schiff. Гусеницы обнаружены нами в бассейне оз. Севан (хребет Арегуни) на листьях кизильника (*Cotoneaster saxatilis* Pojark., 22.VI.1970). Окуклились в свернутых листьях (10—12.VII.1970), вылет бабочек отмечался 19—24.VIII.1970. В условиях Севана в год дает одно поколение.

7. *Croesia bergmanniana* L. Этот вид нами отмечен в декоративных насаждениях Еревана, Севана, Дилижана и Кировакана, а также в лесах центральной и северной Армении. Гусеницы весной и в начале лета повреждают листья и молодые побеги шиповника и роз.

В год дает одно поколение. Зимуют яйца, откладываемые по одному на ветви и побеги. Часто серьезно вредит в садах и парках.

8. *Croesia holmiana* L. Нами отмечена в Дилижане и в Кировакане на груше. Гусеницы повреждают листья плодовых пород. Окукление происходит в конце июня в свернутых листьях, вылет бабочек в середине июля.

9. *Pandemis corylana* F. Гусеницы с апреля повреждают распускающиеся листья жимолости (*Lonicera tatarica* L.). Окукливаются между листьями в начале июня. Бабочки встречаются в середине июня и в июле. Распространена в декоративных насаждениях Еревана.

10. *Spierhasia virgaureana* Tr. Гусеницы в начале июня повреждают листья будлеи (*Buddleia davidii* Frach.). Окукливаются между листьями в середине июня, вылет бабочек отмечался в первой половине июля. По литературным данным [3], вредит землянике. Распространена в декоративных насаждениях Еревана.

11. *Ancyliis achatana* F. В Ереване и Кировакане гусеницы этого вида нами найдены на боярышнике и кизильнике. В год дает одно поколение. Зимуют гусеницы третьего возраста в паутинном коконе, обычно под сухими листочками, прикрепленными паутиной к ветке. Окукление в Ереване в 1964 г. отмечалось в конце мая в развилках веток, через 12—15 дней из куколок вылетели бабочки.

12. *Ancyliis apicella* Schiff. Гусеницы этого вида нами найдены в Норкском и Аванском ущельях (г. Ереван) на крушине (*Rhamnus pallasii* Fisch. et C. A. Mey). Окукление в 1967 г. отмечалось в начале июля в свернутых листьях, вылет бабочек в середине июля.

13. *Notocelia suffusana* Z. В Ереване гусеницы найдены на шиповнике и розе, повреждают почки и листья. В 1965 г. гусеницы собраны с шиповника 25.IV, окукление отмечалось 27—30.V, вылет бабочек—10—12.VI.

По литературным данным [3], гусеницы повреждают боярышник, яблоню и терн.

14. *Epinothia tenerana* Schiff. В лесах северной Армении встречается в мас-

совом количестве. В Кировакане и Иджеване гусеницы этого вида нами найдены на лещине и вязе весной, питаются листьями. В Кироваканском ботаническом саду гусеницы были собраны на лещине в конце апреля (26.IV.1966 г.), окукление отмечалось в почве в начале мая (2.V), вылет бабочек в первой декаде июня. В Иджеванском районе гусеницы собраны в лесу (участок Нжара) на вязе (*Ulmus elliptica* C. Koch) 25.IV.1966 г., окукление отмечалось 10.V.1966 г. в свернутых листьях, вылет бабочек—26.V.1966 г.

15. *Grapholitha janthinana* Dup. В Ереванском ботаническом саду гусеницы найдены нами в плодах различных видов боярышника 31.VIII.1965 г., вылет бабочек отмечен в конце июня—начале июля следующего года. Этот вид нами отмечен и в Шамшадинском районе, где сильно повреждает плоды черного боярышника. А. С. Аветян гусеницы этого вида были обнаружены в Гехарде (Абовянский р-н) и в Асни (Арагатский р-н) также на боярышнике.

16. *Grapholitha tenebrosana* Dup. Гусеницы в плодах различных видов шиповника и роз, которым иногда заметно вредят. Зимует взрослая гусеница в почве в коконах, окукление весной. В условиях Ереванского ботанического сада бабочки вылетели во второй декаде июня (23.VI.1969 г.).

Институт ботаники
АН АрмССР

Поступило 6.VI 1971 г.

Գ. Ա. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ

ՏԵՐԵՎԱՈՒՐ ԹԻԹԵՆԵՐԻ ՆՈՐ ՏԵՍԱԿՆԵՐ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՖԱՈՒՆԱՅԻ ՀԱՄԱՐ

Ա մ փ ո փ ո լ մ

Ներկա հոդվածը Հայաստանի մի քանի քաղաքների՝ Երևանի, Լենինականի, Կիրովականի, Դիլիջանի, Սևանի ղեկորատիվ տնկարկների, ինչպես նաև մասնակիորեն կենտրոնական և հյուսիսային Հայաստանի անտառների վնասակար էնտոմոֆաունայի հետազոտության արդյունք է:

Հետազոտված 44 ցեղի ծառերի և թփերի վրա հայտնաբերել ենք 49 տեսակի տերևաուոր թիթեռներ, որից 18-ը մինչ մեր ուսումնասիրությունները Հայաստանի ֆաունայում նշված չէին: Նոր հայտնաբերված տեսակների մի մասը մեր կողմից հրատարակվել է, մնացած 16 տեսակը ներկայացվում է այս հոդվածում, ուր որոշ տվյալներ են բերվում հայտնաբերված տերևաուոր թիթեռների բիոէկոլոգիական առանձնահատկությունների, վնասատվության չափի և տարածվածության մասին:

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Арутюнян Г. А. Биологический журнал Армении, XIX, 1, 1966.
2. Арутюнян Г. А. Тезисы докладов научн. сессии Совета ботанических садов Закавказья по интродукции растений в Кировакане. Изд. АН АрмССР, Ереван, 1969.
3. Вредители леса, справочник, 1, 1955.
4. Костюк Ю. А. Зоологический журнал, XIV, 8, 1966.
5. Кузнецов В. И. Энтомологическое обозрение, XIV, 3, 1966.