

ԴԱԳԱՐԱՄԿՆԵՐԻ (DIPODIDAE) ԸՆՏԱՆԻՔԸ ԼՂՀ ՏԵՐԻՈՖԱՌՈՒՆԱՅՈՒՄ

Վ. Տ. Հայրապետյան
Կենսաբանության ամբիոն

Այս կենդանիները կրծողների կարգի յուրօրինակ խումբ է, որոնք մկնակերպերի և ցատկամկների վերնաընտանիքի հետ միասին կազմում են Dipodidae ընտանիքը (2,3):

Ճագարամկներն ունեն առանձնահատուկ տեսք, հետին վերջույթները բավականին երկար են և ուժեղ, իսկ առաջինները՝ կարճ: Նրանք դանդաղ քայլի ժամանակ քայլում են չորս ոտքերով, արագի դեպքում՝ երկու հետին ոտքերով, ցատկումներով: Հետին վերջույթներն ունեն ամուր և երկար ճանկերով հինգ մատ, առաջինները ևս հնգամատ են:

Պոչը երկար է և գերազանցում է մարմնի երկարությանը, ավարտվում է սև ու սպիտակ երկար մազափնջով: Պոչը ծառայում է նաև որպես հավասարակշռության օրգան, ցատկումների ժամանակ այն պահվում է ուղիղ, պոչածայրը փոքր ինչ դեպի վերև: Ականջները խոշոր են, ծայրում վառ արտառայությամբ կլորավուն, այն ունի մոտ մազածածկ, փախուստի ժամանակ ուղղում է դեպի մեջքի կողմը:

Նրանց մարմնի մեջքային մասերն ունեն դեղնագույն մոխրագույն, կարմրադարչնագույն փունավորում, իսկ որովայնային հատվածը և պոչերի ծայրերի մազափնջերը՝ սպիտակ: Ազդրերի վրայի գոտիները և թաթերի ծայրերը սպիտակավուն են: Արցախի կրծողների ֆաունայում տարածված ճագարամկների համար գունային բազմերանգությունը պայմանավորված է նրանց բնակավայրերի էկոլոգիական առանձնահատկություններով: Նրանք բնակություն են հաստատում Մարտակերտի, Մարտունու և Հաղորթի կիսաանապատային (ծ.մ. 250 - 500 մ) և լեռնատափաստանային (ծ. մ. 1100 մ) գոտիներում:

Կիսաանապատային և տափաստանային գոտում բնակվող ճագարամկների մեջքային մասը դեղնագույն մոխրագույն երանգ ունեն, իսկ լեռնատափաստանային գոտում բնակվողները ունեն կարմրադարչնագույն երանգ: Հարկ է նշել, որ կախված բիոտոպներից կամ բիոգենոզներից գունային երանգը կրում է նաև պաշտպանողական բնույթ:

Ճագարամկները գիշերային կենդանիներ են: Օրվա լուսավոր ժամերին թաքնվում են իրենց կառուցած բներում, հողով խցանելով մուտքը: Բների կառուցման համար նախընտրում են քարաբլուր և ամուր գլուխով վայրեր:

Սովորաբար ճագարամկները կառուցում են երկու տիպի բներ՝ պարզ-ժամանակավոր և հիմնական, ամառային և ձմեռային, ավելի բարդ ու խոր: Հիմնական բներում 40- 60 սմ խոյությամբ վրա կառուցում են մեկ կամ մի քանի բնային խուցեր:

Մեր հետազոտության օբյեկտ են հանդիսացել ճագարամկների – Dipodidae ընտանիքի, գետնաճագարամկների–Allactaga ցեղին պատկանող կենդանատեսակները: Հետազոտությունները կատարվել են ԼՂՀ- ի վերը նշված շրջանների կիսաանապատային, լեռնատափաստանային գոտիներում: Ուսումնասիրությունները կատարվել են տարվա տարբեր ժամանակներում, յոթսկզումների ձևով:

Կենդանիներ որսալու համար օգտագործել ենք տարբեր բնույթի թակալողներ, որսած կենդանիները ենթարկել ենք մորֆոմետրիկ չափումների: Հետազոտությունների հիմնական նպատակն է եղել կատարել ճագարամկների տեսակային կազմի վերաբնութային, նրանց որոշ վարքագծային և էկոլոգիական առանձնահատկությունների ուսումնասիրություններ:

2002 թվականից առ այսօր ԼՂՀ կենդանական աշխարհում հայտնաբերված են հնգամատ ճագարամկների (Allactaga F. Civeri, 1836) ցեղի երկու տեսակ՝ փոքրասիական կամ լեռնային

նագարամուկ – *Allactaga williamsi* Thomas, 1897, և փոքր նագարամուկ – *Allactaga elater* Lichtensteni, 1825,(14): Սակայն. պետք է ասել, որ չի ժխտվում այլ տեսակների առկայությունը:

Այս կենդանիների մոտ մշակված է բարդ վարքագիծ: Նրանք վարում են զուտ գիշերային կենսակերպ: Բներն ունեն երկու մուտք, մեկը՝ պահուստային, որտեղով վտանգի դեպքում հանկարծակի դուրս են նետվում և մեծ արագությամբ (ցատկոմաներով) դիմում փախուստի: Բներում ապրում են միայնակ, նույնիսկ ավագանիների հարևանությամբ:

Ձագերի խմամբը տաճում է մայրը, վտանգի դեպքում արագ տեղափոխում է ձագերին, անգամ սատկած ձագերին: Ձագահանության ժամանակ վերանորոգում են բները: Ձագերին կաթով կերակրում են մոտ 35-45 օր: Ձագերը դառնում են ինքնուրույն 2,5 –3 ամսականում, իսկ երկարյալ տարում մասնակցում բազմացմանը (1):

Հիյուրյան տևողությունը 27-30 օր է: Սերնյուն ունենում են 1- 6 ձագ: Բազմացումը տեղի է ունենում ձմեռային քնից անմիջապես հետո, գարնան առաջին ամսվա կեսերին: Տարվա մեջ բազմանում են 1-2 անգամ: Այս կենդանիները ձմեռային ընդմեջ մտնում նոյեմբերի կեսերից մինչև մարտի կեսերը:

Նագարամուկներն ունեն բարձր էկոլոգիական ճկունություն, որն էլ ինտրավայրային է տալիս նրանց հարմարվել կիսաանապատային գոտու դաժան բնակիչմայական պայմաններին: Նրանք սնվում են բույսերի վեգետատիվ մասերով, տիտուկներով, արմատներով, սերմերով, հաճախ էլ միջատներով և նրանց բոլորներով:

Այս կենդանիները մեծ ակտիվություն են ցուցաբերում գիշերվա առաջին կեսին: Որտեղ նրանք խիտ են բնակված, մեծ վնաս են հասցնում գյուղատնտեսությանը, փչացնում են գանձակը, բանջարեղենները: Հանդիսանում են ժանտախտի հարուցիչի կրողը (4):

Նագարամուկների բնական թշնամիներից են աքիսը, քարակզարիսը, խայտապիսը, աղվեսը, գիշերային կենսակերպ վարող գիշատիչ թռչունները:

Ամփոփում

Հետազոտությունների արդյունքում ԼՂՀ կրծողների ֆաունայում առ այսօր հայտնաբերվել է նագարամուկների 2 տեսակ *Allactaga williamsi* Thomas, 1897 և *Allactaga elater* Lichtensteni, 1825, որոնք տարածված են Մարտակերտի, Մարտունու և Հաղյուռի կիսաանապատային գոտում: Պարզաբանված է նաև նրանց էկոլոգիական և վարքագծային առանձնահատկությունների որոշ հարցեր:

Резюме

В результате исследования фауны грызунов НКР на сегодняшний день были выявлены тушканчики двух видов: *Allactaga williamsi* Thomas, 1897 и *Allactaga elater* Lichtensteni, 1825, которые распространены в полупустынной зоне Мартакертского, Мартунинского и Тадрудского районов.

Были выяснены также некоторые вопросы, касающиеся их экологических и этологических особенностей.

Գրականություն

- 1.Завитковская Е. Г., Հայրապետյան Վ. Տ., Գարաբաղի վայրի կարճատևները, Ստեփանակերտ, 2003թ.:
- 2.Павлов Н. Я., Россолимо О. Л., Систематика млекопитающих СССР, Моск., изд. МГУ, 1987.
- 3.Павлов Н. Я., Россолимо О. Л., Репрезентативное изображение млекопитающих, по материалам экспоз. южн. музея, МГУ, изд. МГУ, 1997.
- 4.Соколов В. Е., Систематика млекопитающих, Моск., "Высшая школа", 1977.