Т. М. Соснихива

**О нахождении костей пищухи (*Ochotona* sp.)
в Армянской ССР**

(Представлено В. О. Гулканяном 9 VII 1947)

По данным С. И. Огнева (*) „Пищухи распространены, начиная с Восточной Европы (от области Заволжья), по всей остальной Евразии. При этом ареал распространения пищух простирается от крайнего предела северных полярных тундр, через бореальную область в горные страны южной Туркмении, северного Ирана, Сеистана, Гималаев, Гаянь-Су, Сы-Чуани“.

М. В. Шидловским высказывалось предположение о возможности нахождения пищухи в юго-восточной Армении.

Летом 1946 г. экспедицией Зоологического Института АН Арм. ССР под руководством ст. науч. сотр. С. К. Даль на Даралагезском хребте было обнаружено присутствие пищух. В погадках филина, собранных в окр. сел. Амагу (Микоянский р-он), была найдена пара обломанных нижних челюстей пищух. На челюстях удалось сделать следующие промеры: длина диастемы—7 мм, длина зубного ряда—9,9 мм, высота челюсти у переднего края альвеолы Pm_1 —6,5 мм. Эти величины, соответствующие таковым рыжеватой пищухи, позволяют предполагать, что найденные нами остатки челюстей принадлежат *Ochotona rufescens* Gray., ареал которой (Копет-даг, северо-восточная часть Ирана, Афганистан, Белуджистан, северо-восточная Индия) расположен ближе к Закавказью по сравнению с ареалами других видов пищух.

Род *Ochotona* по своему происхождению является центрально-азиатским. Вид же *Ochotona rufescens* Gray представляет собой элемент иранской фауны. Констатирование этой пищухи в Закавказье лишний раз подтверждает мнение Н. А. Бобринского (1) о близости фаун Копет-дага и Закавказья. Указанный автор пишет, что „...Копет-даг, связанный с Закавказьем лесистым Эльбурсом, можно считать в фаунистическом отношении за восточное продолжение нагорного Закавказья“.

Нахождение пищух в Армянской ССР устанавливает самый западный пункт их современного распространения в Евразии.

Предположение о возможности заноса филином остатков рыжеватой пищухи из установленных ранее крайних пределов ареала распространения этого вида, противоречит данным биологии филина. По М. А. Мензбиру (1) эта птица ведет оседлый образ жизни. Миграции ее бывают только в случае выпадения глубокого снегового покрова, что в ю.-в. Закавказье, на Копет-даге и в северном Иране не имеет места.

Зоологический Институт
Академии Наук Арм. ССР
Ереван, 1947. июнь

Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Н. А. Бобринский, Л. А. Зенкевич, Я. А. Бирштейн. География животных. Москва, 1946. 2. М. А. Мензбир. Птицы, 1909. 3. С. И. Огнев. Звери СССР и прилегающих стран. Грызуны, т. IV, изд. АН СССР, 1940.

Թ. Մ. ՍՈՍՆԻՍԻՆԱ

Հայկական ՍՍՏ-ում օխոտոնայի ոսկորներ (Ochotona sp.)
հայտնաբերելու մասին

Հայկական ՍՍՏ-ի Գիտությունների Ազգային գիտությունների ակադեմիայի կենդանաբանական էքսպեդիցիան, 1946 թ. Դարալագյազի լեռնաշղթայում (Միկոյանի շրջ., Ամաղու գյուղի շրջակայքում) բուսերի փոխազնդի մեջ գտել էր օխոտոնայի միացորդներ (սառըին ծնոտը), որոնք, ըստ երևույթին, պատկանելիս են եղել *Ochotona rufescens* Gray.

Դրանով մի ավելորդ անգամ ևս հաստատվում է Ն. Ա. Բորրինսկու կարծիքը Կոպետ-դաղի և Անդրկովկասի մերձավորությամբ մասին Փառնայի տեսակետից: Օխոտոնայի գյուղացի Հայկական ՍՍՏ-ում սահմանում է նրա այժմյան տարածման ամենաարևմտյան կետը Եվրասիայում: