ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՍՍՌ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԿԱԴԵՄԻԱՅԻ ԶԵԿՈՒՅՑՆԵՐ
ДОКЛАДЫ АКАДЕМИИ НАУК АРМЯНСКОЙ ССР
XX 1955 4

ЗООЛОГИЯ

Н. Н. Акрамовский

Новые и редкие наземные моллюски из Армении
(Gastropoda — Stylommatophora)

(Представлено Г. Х. Буniятяном 20 I 1955)

В предлагаемой статье описываются некоторые новинки для фауны современных моллюсков Армении.

1. Vallonia tenuilabris (Al. Br.) var. ladacensis Nevill. Вид был известен до сих пор из Сибири, из северного Китая, с Дальнего Востока, а также из горных областей Центральной и Средней Азии. В ископаемом состоянии встречается в верхнем плиоцене и плейстоцене Европы ([1]).

Нами был собран в живом состоянии в двух пунктах Армении: а) Гукасянский район, окр. с. Вер. Гукасян, субальпийская зона Кечутских (Мокрых) гор; б) Котайкский район, кочевки с. Капутан, субальпийская зона Гегамского (Ахмаганского) хребта. В обоих случаях был найден в незадернелых каменных россыпях.

Высокие части Армянского нагорья являются, следовательно, до сих пор убежищем этого вида, вымершего в Европе в течение плейстоцена.

2. Armenica disjuncta (Mort.) и Armenica unicristata (Bttg.). Первый из названных видов был описан из Западной Армении ([2]). В 1948 г. я отметил ([3]) из сел. Гнишик, Азизбековского района Armenica unicristata (Bttg.); определение было сделано без сравнительного материала и, как теперь выяснилось, оказалось ошибочным. В действительности, это была A. disjuncta (Mort.). Этот вид входит, следовательно, в состав фауны СССР и Советской Армении, в частности. Он относится к скаложилам преимущественно степной зоны Южной Армении. A. unicristata (Bttg.), также живет в Советской Армении. Я собирал ее в окрестностях Дилижана на Базумском (Бзовдальском) хребте, в Кафанском районе (окр. с. Мусаллам и с. Вачаган) и в окр. Гориса. Это — скаложил лесной зоны Северной и Восточной Армении.

3. Vitrea emmae Akramowski, sp. nova (рис. 1). В Иджеванском районе нам встретился новый для науки вид, описание которого приводим.

Диагноз. Vitrea с широким, перспективным пупком, с раковиной шириною до 4,5 мм при четырех оборотах, с последним оборотом вдвое шире предпоследнего.

Описание. Раковина низко коническая, очень тонко неравномерно исчерчена, гладкая, блестящая, серовато-прозрачная, с просвечивающими сквозь эпидермис тонкими спиральными линиями. Оборотов 4, довольно выпуклых, несколько быстро возрастающих; последний оборот в два раза шире предпоследнего. Устье широко полулунное, ширина его больше высоты, верхний край едва, нижний же ясно выпуклый. Пупок широкий и вполне перспективный, ширина его составляет $^2/_9$ ширины раковины. Высота раковины 2 *мм*, ширина 4,5 *мм*.



Рис. 1. Vitrea emmae Akramowski, sp. nova. Раковина. Голотип (Армения, Иджеван. р-н, с. Верин Агдан, ущелье Лаки, 25. VII. 1952, Н. Н. Акрамовский).

Сравнение. По широкому, перспективному пупку напоминает V. contracta (West.), V. botteri (L. Pfr.), V. nadejdae (Lindh.), V. pygmaea (Bttg.) (1). Отличается от них, прежде всего, большей величиной: у нашего вида ширина раковины 4,5 *мм*, а у перечисленных — от 3.8 до 2 *мм*; в этом отношении к нему приближается только V. nadejdae из Крыма с шириной раковины до 3.8 *мм*, которая легко разнится от нашего вида большим количеством оборотов (5—6) и узким последним оборотом, который лишь немного шире предпоследнего. От V. contracta и V. botteri надежно отличается также значительно более широким пупком, а от V. pygmaea, к которой он ближе всего по форме раковины, — большой разницей в величине: у V. pygmaea ширина раковины не более 2 *мм* при том же количестве оборотов, равном четырем.

Типы. Тип и два паратипоида, пустые раковины собраны мною в окрестностях сел. Верин Агдан, Иджеванского района, Армянской ССР, в ущелье Лаки, среди скал по южному склону. Хранятся в коллекциях Зоологического института Академии наук Армянской ССР (Ереван). Вид назван в честь моей жены Э. Г. Акрамовской.

Повидимому, наряду с Ena schuschaënsis (Kob.), которая, кстати сказать, также была собрана вместе с этим видом, принадлежит к немногочисленной группе эндемичных скаложилов лесной зоны Малого Кавказа.

4. Vitrea retowskii (Lindh.) (рис. 2). Вид был описан Линдгольмом (4) из Абастумани (Восточная Грузия) в 1914 г. по единственной пустой раковине. С тех пор его более никто не находил. Типичный экземпляр, повидимому утерян, так как его нет в Зоологическом ин-

ституте Академии наук СССР, куда поступила коллекция Линдгольма после его смерти.

Нам удалось собрать этот вид в двух пунктах Армении: а) в Степанаванском районе, окр. Лорийского племенного совхоза, на склонах горы Урасар; б) в окрестностях Дилижана, на склонах горы Айридаш и около монастыря Агарцин. Оба пункта расположены на Базумском (Безовдальском) хребте, который на северо-западе переходит в Кечутские (Мокрые) горы, уходящие в Грузию. Вид обитает в каменных осыпях у верхней лесной опушки и в нижней части субальпийской зоны. Очевидно его следует считать высокогорным эндемиком Малого Кавказа.



Рис. 2. Vitrea retowskii (Lindh.). Раковина (Армения, Степанаван. р-н, пос. Лорплемсовхоз, 26. VII. 1951 Н. Н. Акрамовский).

Некоторые экземпляры из Лорийского совхоза вполне подходят под описание Линдгольма, другие несколько уклоняются благодаря тому, что завиток делается немного более высоким, а последний оборот становится не в три, а только в два с половиной раза шире предпоследнего. Популяция из окрестностей Дилижана отличается тем, что последний оборот у нее еще у'же, только в два раза шире предпоследнего оборота. Однако сравнение с экземплярами из Степанаванского района показывает почти полное сходство обеих популяций во всех остальных отношениях и, следовательно, свидетельствует о принадлежности дилижанских экземпляров к тому же виду.

5. О так называемой Birulana siraphora (West.). В 1897 г. Вестерлунд (4) описал из окрестностей Нахичевани-на-Араксе новый вид Hyalinia siraphora, отличавшийся от всех видов семейства Zonitidae тем, что на парietальной стенке устья, непосредственно под местом прикрепления верхнего края, у него находилась короткая складка, параллельная шву. Описание было сделано по единственному экземпляру; этот экземпляр, тип вида, хранится в Зоологическом институте Академии наук СССР (Ленинград). Он изображен у Лихарева и Раммельмейер (1). Более никто этого вида не находил; можно было думать, что он крайне редок.

Поскольку характерное для вида образование — складка в устье совершенно не свойственна всему семейству, к которому вид относится, Линдгольм в 1922 г. (6) выделил его в особый род Birulana Lindh

Нам при сборах моллюсков неоднократно попадались экземпляры соответствующие описанию Вестерлунда. При этом они встречались вместе с широко распространенным в восточной половине Кавказа видом Oxychilus derbentinus (Bttg.); последний весьма похож на Birulana siraphora, отличаясь от него большим количеством оборотов и соответственно большей величиной раковины, а также отсутствием в устье упомянутой характерной складки.

Однако, более тщательное исследование вполне типичных экземпляров Oxychilus derbentinus обнаружило эту складку у взрослых особей, но не в устье, а глубже; поэтому она оставалась до сих пор незамеченной. Взрослые O. derbentinus всегда имеют сверху у шва резкое вдавление около границы 3-го и 4-го оборотов или несколько ближе к вершине. От этого вдавления отходит ясная поперечная складка, заметно отличающаяся по степени выраженности от слабой поперечной исчерченности, свойственной всей остальной поверхности раковины. Именно под вдавлением находится короткая париетальная борозда; однако увидеть ее можно, только вскрыв стенку раковины в указанном месте. Эту складку мы нашли также и у экземпляров O. derbentinus из Дербента, места первого описания данного вида, которые мы имели возможность исследовать в Зоологическом институте Академии наук СССР (Ленинград).

Поэтому складку следует считать за признак молодых раковин вида Oxychilus derbentinus (Bttg.), а Birulana siraphora (West.) попадает, таким образом, в синонимы первого вида:

Hyalinia (Polita) derbentina O. Boettger, 1886. Jahrb. deutsch. malakozool. Gesellsch., v. 13, p. 130; pl. 3, fig, 3.

Syn.: Oxychilus derbentinus auct. recent.

Hyalinia (Polita) siraphora Westerlund, 1897. Ann. Mus. Zool. St. Pétersbourg, v. 2, p. 118.

Birulana siraphora Lindholm, 1922. Ann. Mus. Zool. Petrograde, v. 23, p. 306.

Зоологический институт
Академии наук Армянской ССР

Ն. Ն. ԱԿՐԱՄՈՎՍԿԻ

Նոր և հազվագյուտ ցամաքային մոլլյուսկներ Հայաստանից

Հոդվածում նկարագրված են մի քանի նորություններ Հայաստանի ժամանակակից մոլլյուսկների ֆաունայի համար։

1. Vallonia tenuilabris (Al. Br.) var. ladacensis Nevill: *Այդ տեսակին պատկանում էր Եվրոպայի վերին պլիոցենում և պլեյստոցենում։ Մինչև այժմ նա ապրում է պալեարկտի-կական Ասիայում, որտեղից հայտնի է Միջին Ասիայի լեռներում և այլ [illegible]։ Ինձ հայտնաբերված է նաև Հայաստանի լեռներում ([illegible] լեռներ և Գեղամա լեռ-նաշղթա)։*

2. Armenica disjuncta (Mort.)-ն, *որը մինչև այժմ միայն արևելյան [illegible] հայտնի էր [illegible], ապրում է նաև Հայաստանում (Հայոցձոր)։ Սա նոր լրացում է Կովկասի և ՍՍՀՄ-ի ֆաունայի համար։*

3. Vitrea emmae Akramowski, sp. nova՝ գիտության համար նոր տեսակ գտնված է Իջևանի շրջանի Վերին Աղդան գյուղում։

4. Vitrea retowskii (Lindh.)-ն նկարագրված է եղել Արտաթումանից (Վրաստան) 1914 թվականին միակ օրինակի հիման վրա և այդ ժամանակվանից էլ ոչ որի կողմից հայտնաբերված չի եղել։ Այժմ հանդիպել է Բազումի լեռնաշղթայում Լոռի-Պամբակի և Իջևանի շրջակայքում։

5. Birulana siraphora (West.)-ն համարվել է որպես էնդեմիկ տեսակ ու սեռ Նախիջևանի համար։ Հոդվածում պարզաբանվում է, որ փաստորեն դա Հայաստանում և ընդհանրապես ամբողջ Արևելյան Կովկասում լայն տարածված Oxychilus derbentinus (Bttg.) տեսակի երիտասարդ անհատներ են։

ЛИТЕРАТУРА—ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

[1] *И. М. Лихарев* и *Е. С. Раммельмейер*, Наземные моллюски фауны СССР, М.—Л., Изд. АН СССР, 1952. [2] *Г. Мортиллэ*, Mém. Inst. Nat. Genève, 2, 1—16 (sép.), 1854. [3] *Н. Н. Акрамовский*, Зоол. сб. (АН АрмССР, Ин-т фитопат. и зоол.), 6, 127—183, 1948. [4] *В. А. Линдгольм*, Nachr.-bl. deutsch. malakozool. Gesellsch., 46, 33—38, 1914. [5] *К. А. Вестерлунд*, Ежег. Зоол. муз. АН, 2, 117—148, 1897. [6] *В. А. Линдгольм*, Ежег. Зоол. муз. Росс. АН, 23, 304—320, 1922.