А. Г. Никогосян

Об одной нелинейной задаче полихроматического диффузного отражения от бесконечно глубокой одномерной среды

(Представлено академиком В. А. Амбарцумяном 9/VIII 1964)

Ранее ⁽¹⁾ был изучен один частный случай полихроматического чистого рассеяния в одномерной среде. При этом рассматривался случай среды, состоящей из атомов, имеющих три энергетических уровня. Второй уровень считался метастабильным, так что, ввиду отсутствия циклических переходов $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ и $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, задача сводилась к чистому рассеянию в каждой из частот ν_{12} и ν_{23} в отдельности (здесь и ниже частоты ν_{13} и ν_{23} назовем соответственно первой и второй частотами). Однако пренебрегать переходами $2 \rightarrow 1$ (обозначенный пунктиром на фиг. 1) можно не всегда, поскольку эти переходы, даже если они обладают небольшой вероятностью, все же могут повести к появлению эффектов, имеющих для некоторых задач существенное значение. Эти переходы могут быть либо спонтанными, либо происходящими в результате столкновений. Мы рассмотрим случай переходов $2 \rightarrow 1$ без излучения, вызванных ударами второго рода. При этом мы будем пренебрегать возможными переходами $1 \rightarrow 2$ в результате ударов первого рода. Другими словами, из двух взаимно противоположных циклических процессов типа $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 1$ и $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ мы принимаем во внимание лишь цикл $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$, сопровождающийся переработкой квантов первой частоты во вторую, пренебрегая вместе с тем циклическими переходами, происходящими в обратном направлении. Такое приближение верно при низкой температуре среды и при соответственно малой начальной энергии сталкивающихся частиц. При отсутствии циклических переходов условия стационарности одновременно являлись и условиями чистого рассеяния в каждой из частот. Теперь же, вследствие переходов $2 \rightarrow 1$, условия чистого рассеяния не соблюдаются. Условия стационарности имеют вид:

Фиг. 1.

$$n_1 B_{13} \rho_1 = n_3 B_{31} (\rho_1 + q_1) + n_2 b_{21}, \quad \text{где } q_i = \frac{8\pi h \nu_i^3}{c^3}, \quad i = 1, 2$$

$$n_2 (B_{23} \rho_2 + b_{21}) = n_3 B_{32} (\rho_2 + q_2),$$

и b_{21} — вероятность перехода $2 \rightarrow 1$ в результате столкновений. Вероятность выживания кванта первой частоты при элементарном акте рассеяния определяется так:

$$\lambda = \frac{n_3 B_{31} q_1}{B_{13} \left(n_1 - \frac{g_1 n_3}{g_3} \right) q_1}$$

где g_1 и g_3 обозначают статические веса, соответственно для первого и третьего уровней. А вероятность превращения кванта первой частоты в квант второй частоты при элементарном акте рассеяния будет $1 - \lambda$.

Если имеем дело с относительно малыми интенсивностями излучения, то $\rho_1 \ll q_1$ и $\rho_2 \ll q_2$. Иначе говоря, если пренебрегать вынужденными переходами вниз по сравнению со спонтанными, то приведенные выше уравнения примут вид:

$$\begin{aligned} n_1 B_{13} \rho_1 &= n_3 B_{31} q_1 + n_2 \rho_{21} \\ n_2 (B_{23} \rho_2 + b_{21}) &= n_3 B_{32} q_2 \end{aligned} \quad (1)$$

и
$$\lambda = \frac{n_3}{n_1} \cdot \frac{B_{31} q_1}{B_{13} \rho_1} \quad (1')$$

Определим из (1) отношение $\frac{n_3}{n_1}$, входящее в выражение для λ :

$$\frac{n_3}{n_1} = \frac{\rho_1 (\rho_2 + a)}{\frac{g_1}{g_3} q_1 (\rho_2 + a) + q_2 \frac{g_2}{g_3} b}$$

где введены обозначения:

$$\frac{b_{21}}{B_{23}} = a; \quad \frac{b_{21}}{B_{13}} = b.$$

Теперь для λ получим:

$$\lambda = \frac{\rho_2 + a}{\rho_2 + a + \frac{g_2 q_2}{g_1 q_1} b}$$

или

$$\lambda = \frac{1}{1 + \frac{g_2 q_2}{(\rho_2 + a) g_1 q_1} b} \quad (2)$$

Как видно из (2), λ меньше единицы вследствие того, что часть поглощенных квантов первой частоты переизлучается во второй частоте. С другой стороны λ теперь не постоянна, а зависит от плотности излучения, в чем проявляется нелинейность настоящей задачи. По той же причине систематической переработки квантов одной частоты ($h\nu_{12}$) в кванты другой частоты становится меньше единицы и коэффициент диффузного отражения в первой частоте. Вследствие этого

целесообразно рассмотреть при этих условиях проблему диффузного отражения и прохождения.

В настоящей статье мы ограничимся задачей диффузного отражения от бесконечно глубокой одномерной среды, обладающей описанными свойствами. Пусть бесконечно глубокий слой освещается потоками света двух частот F_1 и F_2 (соответственно для ν_{11} и ν_{22}). Зададимся целью определить потоки H_1 и H_2 , отраженные от среды в соответствующих частотах. Здесь и далее всегда потоки будут выражаться не в энергетических единицах, а в числах квантов. Поскольку мы рассматриваем стационарную задачу, то в каждой точке будет иметь место определенное распределение атомов по состояниям. Функцией $\varphi(F_1, F_2)$ выразим зависимость H_i от падающего излучения. Для получения дифференциального уравнения, которому удовлетворяла бы искомая функция $\varphi(F_1, F_2)$, воспользуемся „принципом инвариантности“, заключающимся в том, что прибавление к данной среде слоя бесконечно малой толщины не должно сказаться на отражательной способности среды. Для характеристики оптических свойств этого бесконечно тонкого слоя введем его оптические толщины σ_1 и σ_2 , соответственно для первой и второй частот. Отношение этих оптических толщин определяется полем излучения и не может быть задано заранее. Мы определим это отношение ниже. Введем коэффициент x , заменяющий в одномерном случае индикатрису рассеяния. Он равен вероятности распространения кванта в его прежнем направлении после элементарного акта рассеяния. Если обозначим через F'_1 и F'_2 значения потоков, идущих вглубь от границы прибавленного слоя, то, как не трудно убедиться из

Фиг. 2

$$F'_1 = F_1(1 - \sigma_1) + \lambda x F_1 \sigma_1 + \lambda(1 - x) H_1 \sigma_1.$$

Ограничимся случаем изотропного рассеяния,

когда $x = \frac{1}{2}$.

В этом случае

$$F'_1 = F_1(1 - \sigma_1) + \lambda \frac{F_1 + H_1}{2} \sigma_1. \quad (3)$$

Из (1) в качестве следствия вытекает равенство:

$$n_1 B_{13} \rho_1 + n_2 B_{23} \rho_2 = n_3 (A_{31} + A_{32}),$$

которое, как не трудно видеть, не что иное, как условие стационарности для третьего уровня, выражающее факт равенства числа поглощенных и излученных квантов. Избыток поглотивших первую частоту атомов над атомами, излучающими ту же частоту, переходит во второе состояние, излучая при этом кванты второй частоты. Принимая сказанное во внимание, получим:

$$F_2' = F_2(1 - \sigma_2) + F_2 x \sigma_2 + (1 - \lambda) x F_1 \sigma_1 + (1 - \lambda)(1 - x) H_1 \sigma_1 + (F_1 + F_2 - H_1)(1 - x) \sigma_2,$$

а при $\lambda = \frac{1}{2}$

$$F_2' = F_2 + (1 - \lambda) \frac{F_1 + H_1}{2} \sigma_1 + \frac{F_1 - H_1}{2} \sigma_2, \quad (4)$$

где λ , как и в (3), определяется из (2), а также учтено, что от бесконечно глубокого слоя в двух частотах вместе отражается ровно такое суммарное количество квантов, какое падает на него, т. е. $F_1 + F_2 = H_1 + H_2$. Пользуясь этим, можно переписать выражение (2) для λ несколько по-другому:

поскольку $\rho_2 = \frac{F_1 + 2F_2 - H_1}{c} h\nu_2$, то

$$\lambda = \frac{F_1 + 2F_2 - H_1 + m}{F_1 + 2F_2 - H_1 + n}, \quad (5)$$

где $m = \frac{ca}{h\nu_2}$; $n = m + \frac{ca}{h\nu_2} \frac{g_2 q_2}{g_1 q_1} b$.

Для потока излучения, отраженного от новой границы среды, имеем:

$$H_1 = H_1'(1 - \sigma_1) + \lambda \frac{F_1 + H_1'}{2} \sigma_1.$$

Согласно „принципу инвариантности“ $H_1' = \varphi(F_1', F_2')$, отсюда

$$\varphi(F_1', F_2') = \varphi \left[F_1(1 - \sigma_1) + \lambda \frac{F_1 + H_1}{2} \sigma_1; F_2 + (1 - \lambda) \frac{F_1 + H_1}{2} \sigma_1 + \frac{F_1 - H_1}{2} \sigma_2 \right] - H_1 \sigma_1 + \lambda \frac{F_1 + H_1}{2} \sigma_1.$$

Разлагая в ряд по степеням σ_1 , получим нужное дифференциальное уравнение для $\varphi(F_1', F_2')$:

$$\left(-F_1 + \lambda \frac{F_1 + H_1}{2} \right) \frac{\partial \varphi}{\partial F_1} + \left[(1 - \lambda) \frac{F_1 + H_1}{2} + \frac{F_1 - H_1}{2} \frac{\sigma_2}{\sigma_1} \right] \frac{\partial \varphi}{\partial F_2} - H_1 + \lambda \frac{F_1 + H_1}{2} = 0,$$

где следует помнить, что отношение оптических толщ также зависит от плотности излучения. Как известно, можно написать:

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = k' \frac{n_2}{n_1}, \quad \text{где } k' = \frac{B_{23} \nu_2 \Delta \nu_1}{B_{13} \nu_1 \Delta \nu_2} \quad (1.3)$$

и где $\Delta \nu_1$ и $\Delta \nu_2$ — эффективные ширины соответствующих линий.

Определим $\frac{n_2}{n_1}$ из (1):

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{B_{13} \rho_1 B_{32} q_2}{B_{31} q_1 (B_{23} \rho_2 + b_{21}) + b_{21} B_{32} q_2}$$

или

$$\frac{n_2}{n_1} = \frac{g_2 q_2}{g_1 q_1} \frac{\rho_1}{\rho_2 + a + \frac{g_2 q_2}{g_1 q_1} b}$$

и для $\frac{\sigma_2}{\sigma_1}$ получим:

$$\frac{\sigma_2}{\sigma_1} = k \frac{F_1 + H_1}{F_1 + 2F_2 - H_1 + n} \quad (6)$$

где $k = \frac{B_{23} q_2 g_2 \Delta v_1}{B_{13} q_1 g_1 \Delta v_2}$.

Для простоты введем обозначения $F_1 = y$, $F_2 = y_2$, $H_1 = z$. Тогда окончательно (учитывая (5) и (6)) наше уравнение примет вид: (ср. с (21) (2))

$$\left(-y_1 + \frac{y_1 + 2y_2 - z + m}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2} \right) \frac{\partial z}{\partial y_1} + \frac{n - m + k(y_1 - z)}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2} \frac{\partial z}{\partial y_2} + \frac{y_1 + 2y_2 - z + m}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2} = 0. \quad (7)$$

Итак, задача сводится к решению квазилинейного уравнения с частными производными, решив которое, получим искомую зависимость отраженного от среды потока первой частоты H_1 от падающих на среду потоков F_1 и F_2 .

Уравнения характеристик суть:

$$\frac{dy_1}{-y_1 + \frac{y_1 + 2y_2 - z + m}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2}} =$$

$$\frac{dy_2}{\frac{n - m + k(y_1 - z)}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2}} = \frac{dz}{z - \frac{y_1 + 2y_2 - z + m}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2}};$$

$$dy_1 = \frac{-y_1 + \frac{y_1 + 2y_2 - z + m}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2}}{\frac{n - m + k(y_1 - z)}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2}} dy_2. \quad (8)$$

$$dz = \frac{z - \frac{y_1 + 2y_2 - z + m}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2}}{\frac{n - m + k(y_1 - z)}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2}} dy_2. \quad (9)$$

Вычтя из (8) и (9), имеем:

$$d(y_1 - z) = - \frac{2(n - m)}{n - m + k(y_1 - z)} dy_2$$

и получаем первый интеграл

$$(n - m)(y_1 + 2y_2 - z) + \frac{k}{2}(y_1 - z)^2 = c_1.$$

Для получения второго интеграла, исходим из уравнения:

$$\begin{aligned} & \left(z - \frac{y_1 + 2y_2 - z + m}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2} \right) dy_1 = \\ & = \left(-y_1 + \frac{y_1 + 2y_2 - z + m}{y_1 + 2y_2 - z + n} \frac{y_1 + z}{2} \right) dz; \\ & 2d(zy_1) = \frac{y_1 + 2y_2 - z + m}{y_1 + 2y_2 - z + n} (y_1 + z) d(y_1 + z), \end{aligned}$$

или же

$$2nd(zy_1) = (y_1 + 2y_2 - z)(y_1 - z) d(y_1 - z) + m(y_1 + z) d(y_1 + z)$$

несколько преобразуя, приходим к выражению, которым воспользуемся ниже:

$$\begin{aligned} nd(zy_1) &= \frac{(y_1 + 2y_2 - z)(y_1 - z) d(y_1 - z)}{2} + \frac{m - n}{2} (y_1 + z) d(y_1 + z) - \\ & + \frac{n}{2} (y_1 + z) d(y_2 + z), \end{aligned}$$

$$\frac{n - m}{2} (y_1 + z) d(y_1 + z) = \frac{y_1 + 2y_2 - z + n}{2} (y_1 - z) d(y_1 - z). \quad (10)$$

С другой стороны, складывая (8) и (9), получим:

$$\begin{aligned} & \frac{n - m}{2} (y_1 + z) d(y_1 + z) + \frac{k}{2} (y_1 - z)(y_1 + z) d(y_1 + z) = \\ & = -(y_1 + 2y_2 - z + n)(y_1 - z) dy_2, \end{aligned}$$

Вместе с (10) оно дает

$$\begin{aligned} & (y_1 + 2y_2 - z + n) d(y_1 - z) + k(y_1 + z) d(y_1 + z) = \\ & = -2(y_1 + 2y_2 - z + n) dy_2 \end{aligned}$$

и находим второй интеграл

$$(y_1 + 2y_2 - z + n)^2 + k(y_1 + z)^2 = c_2.$$

Уравнение $G(I_1, I_2) = 0$, где G — произвольная функция своих аргументов, дает решение нашего уравнения в неявной форме. Решение нашего уравнения (7) станет определенным, если учесть начальное условие $z = 0$ при $y_1 = 0$. Физически оно выражает факт отсутствия отраженного от среды излучения первой частоты, если в этой частоте на среду ничего не падает. При этом y_2 может быть любым. Подставляя $y_1 = 0$, $z = 0$ в I_1 , получим

$$2y_2 = \frac{c_1}{n - m},$$

сопоставляя с I_2 , имеем

$$\left(\frac{c_1}{n-m} + n \right)^2 = c_2$$

и получаем:

$$(n-m)(y_1 + 2y_2 - z + n)(y_1 - z)^2 + \frac{\hbar}{4}(y_1 - z)^4 - (n-m)^2(y_1 + z)^2 = 0.$$

(11)

Введя новые переменные

$$u_1 = \frac{y_1}{n}, \quad u_2 = \frac{y_2}{n}, \quad v_1 = \frac{z}{n},$$

приведем полученное решение к более удобному для исследования виду:

$$\alpha(u_1 + 2u_2 - v_1 + 1)(u_1 - v_1)^2 + \beta(u_1 - v_1)^4 + (u_1 + v_1)^2 = 0,$$

где $\alpha = \frac{n}{n-m}$; $\beta = \frac{\hbar \alpha^2}{4}$ — постоянные, не имеющие размерности.

Особый интерес представляет случай, когда отсутствует падающее на среду излучение второй частоты ($u_2 = 0$). Применяя для облегчения вычислений поворот координатных осей на угол $\frac{\pi}{4}$ в пло-

скости (u_1, v_1) , можно построить зависимость $v_1(u_1)$, а следовательно и $v_2(u_1)$, соответственно для отраженного от среды потока во второй частоте. Эти зависимости приведены на прилагаемом графике (фиг. 3).

Как видно из графика, при больших u_1 и, следовательно, больших полях излучения в обеих частотах, атомы, попавшие на второй уровень, скорее возвращаются на третий уровень (поглощая квант $h\nu_{23}$) и далее на первый, нежели спускаются вниз путем соударений, реализуя переход $2 \rightarrow 1$. В случае $u_2 \neq 0$, мы получаем для разных u_2 семейство кривых $v_1(u_1)$, причем боль-

Фиг. 3.

шим u_2 соответствуют кривые, расположенные выше. С другой стороны, при одном и том же значении u_1 , чем больше u_2 , т. е. падающее на среду излучение второй частоты, тем ближе задача к случаю чистого рассеяния, что видно и из (2).

В заключение выражаю благодарность академику В. А. Амбарцумяну, под руководством которого была выполнена настоящая работа.

Бюраканская астрофизическая обсерватория

Академии наук Армянской ССР

**Անվերջ խոր միաչափ միջավայրից դիֆուզ պոլիխումառիկ
անդրադարձման ոչ դժային մի խնդրի մասին**

Կոյություն ունի պղտոր միջավայրում լույսի ցրման խնդիրների ամբողջ մի շարք, որոնցում անկա են ճառագայթման մեծ խտությունները: Այդ դեպքում հնարավոր չէ արհամարհել միջավայրի օպտիկական հատկությունների վրա ընկնող ճառագայթման ազդեցությունը: Առանձին հետաքրքրություն են ներկայացնում ատոմների ըստ վիճակների վերաբաշխման հետ կապված էֆեկտները, որոնք ճառագայթման մեծ խտությունների դեպքում դառնում են էական: Այդ տեսակետից ուշադրավ է դիտարկել անվերջ խոր միաչափ միջավայրից պոլիխումատիկ դիֆուզ անդրադարձման խնդիրը: Ինքնադրենք, որ երևի էներգետիկ մակարդակ ունեցող ատոմներից բաղկացած միջավայրը յուսավորվում է F_1 և F_2 հոսքերով $3 \rightarrow 1$ և $3 \rightarrow 2$ անցումների համապատասխանող ν_1 և ν_2 հաճախականություններում: Երկրորդ մակարդակը ինքնադրվում է մետաստաբիլ, ըստ որում հաշվի են առնվում $2 \rightarrow 1$ հարվածների շնորհիվ կատարվող անցումները: Միևնույն ժամանակ արհամարհվում են նույն հարվածների պատճառով հնարավոր $1 \rightarrow 2$ անցումները: Ուրիշ խոսքով հաշվի է առնվում միայն $1 \rightarrow 3 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ մեկ ուղղությամբ կատարվող ցիկլը, որի հետևանքով $h\nu_2$ քվանտերը սիստեմատիկաբար վերածվում են $h\nu_1$ քվանտերի: Այդ մոտավորությունը ճիշտ է միջավայրի ցածր ջերմաստիճանի և համապատասխանաբար հարվածող մասնիկների փոքր սկզբնական էներգիայի դեպքում: Քվանտի վերապրելու հավանականությունը ցրման էլեմենտար ակտի ժամանակ t -ն տրվում է (5)-ով, իսկ $\frac{\sigma_2}{\sigma_1}$ օպտիկական հաստությունների հարաբերությունը՝ (6)-ով: Բանաձևերից երևում է, որ այդ մեծությունների արժեքները կախված են ճառագայթման դաշտի խտություններից, որով բնորոշվում է խնդրի ոչ դժայնությունը: Կիրառելով ինվարիանտության սկզբունքը, $\varphi(F_1, F_2)$ առաջին հաճախականությունում անդրադարձած հոսքի համար ստացվում է կվադրիդային մասնավոր ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարում (7): Նրա լուծումը մեկ տալիս է $H_1 = \varphi(F_1, F_2)$ -ը անբացահայտ տեսքով (11): Վերջում քննարկվում է մեկ մասնավոր դեպքերը՝ $F_2 = 0$:

Л И Т Е Р А Т У Р А — Գ Ր Ա Կ Ա Ն Ո Ւ Թ Յ Ո Ւ Ն

¹ В. А. Амбарцумян, ДАН АрмССР, т. XXXIX, № 4 (1964). ² В. А. Амбарцумян, ДАН АрмССР, XXXVIII, 4 (1964). ³ В. А. Амбарцумян, Научные труды, т. I, стр. 78—102, Изд. АН АрмССР, Ереван, 1960.