

СИСТЕМАТИКА РАСТЕНИЙ

Я. И. Мулкиджанян

Новый вид груши *Pyrus theodorovii** Mulk. из Армянской ССР

(Представлено чл.-корр. АН Армянской ССР Д. Н. Бабаян 29/X 1964)

Pyrus theodorovii mihi (sec. *Argyromalon* Fed.)—груша Александра Федорова.—Arbuscula, 5—7 m alta, valde ramosa, cortici grisei. Ramuli annotini brunei dense argenteo-tomentosi, aculeis raris spinosis. Gemmae parvae, ovatae, brunnea, pubescentes vel glabrae, ad apice tomentosa. Folia coriacea, anguste elliptica, rarius ad apicem maxime lata, 3—5 (7) cm long., 1,2—1,8 cm. lat., apice rotundata rarius acuminata, margine integra, ad apice (1) 3 (5) dentibus, nigris, parvis obsita, basi lata cuneata, utrinque argenteo-tomentosa. Dentes calycibus utrinque tomentosi. Fructi 2,0—3,0 cm in diam. fere globosi, glabriusculi, solitarii, pedunculis sat crassis ad 1,0 cm long., calycibus persistentibus.

Typus: Armenia, Distr. Vedi. Inter pp. Ketuz et Gelajzor, altitud. 1500—1600 m s. m. 14.VII 1964. Leg. J. Mulkijanian, in Herbario Inst. Botanici Acad. Sciens. USSR Armeniae conservatur.

Деревцо, 5—7 м выс., ствол короткий, от основания ветвистый, до 35 см толщины, с серой, трещиноватой коркой. Ветви растопыренные, серые; укороченные, редко заканчиваются небольшой, 0,5 см, темной колючкой. Кора на молодых ветвях бурая, покрыта гладкой сероватой, пленкой, отслаивающейся небольшими кусками. Молодые побеги, прижато серебристо-войлочные, с непроступающей темно-бурой коркой. Почки небольшие, до 3 мм дл., тупо яйцевидные, бурые, войлочно-волосистые или голые и лишь на концах чешуй с пучком волосков. Облистование густое, пучками, лишь на туррионах междоузлия расположены на удалении 0,5—2 (2,5) см. Листья с узкоэллиптической пластинкой, 3—5 (7) см дл., 1,2—1,8 см шир., часто с наибольшей шириной в верхней части с (1)3(5) парами сближенных, мелких, черных зубчиков в верхней части или листья цельнокрайние, на вершине закругленные, с коротким острием, реже на концах туррионов вверху суженные, острые; у основания округлые или коротко ширококлиновидные; с обеих сторон густо, серебристо войлочные, реже сверху опушение несколько слабее. Черешок

* Описывается в честь крупного ботаника, ресурсоведа Союза ССР, чл.-корр. АН СССР Александра Александровича Федорова.

до 1,5—2 см дл. Цветки небольшие, до 2,0—2,5 см в диаметре. Гипантий и зубцы чашечки с обеих сторон густо серебристо-войлочные. Чашелистики широкотреугольные, до 4 мм дл. Лепестки белые, продолговато обратно яйцевидные. Плоды небольшие, 2,5—3,0 см дл., слегка продолговатые, почти шаровидные, молодые опушенные, на толстоватой ножке, достигающей 1 см дл.



Фиг. 1. *Pyrus theodorovii* Mulk. 1—верхняя часть листа; 2—деталь цветка; 3—лепесток.

Тип. Армянская ССР, Вединский р-н, с. Кетуз х с. Гелайсор, ближе к с. Гелайсор, за водораздельным хребтом. Горная степь. Сев. скл., 1500—1600 м над ур. м., 14/VII 1964. Собрал Я. И. Мулкиджанян. Хранится в гербарии Ботанического института АН Армянской ССР, г. Ереван.

Родство. Отличается от всех видов груш особенно по форме листьев и очень сильному серебристо-войлочному опушению.

Проверенные экземпляры. Армянская ССР, Вединский р-н. Веди х Гелайсор. 26/V 1959 г. Собрали: А. Л. Тахтаджян, Я. И. Мулкиджанян; Армянская ССР, Вединский р-н, с. Кетуз х с. Гелайсор ближе к Гелай-сору, за водораздельным отрогом хребта Еранос, в бассейне ущелья р. Мили. горная степь 1500—1600 м над ур. м., 14/VII. 1964. Собрал Я. И. Мулкиджанян.

Груши Армении, особенно произрастающие в ее южной части, находящейся под сильным влиянием иранской флористической провинции, отличаются исключительным разнообразием видовых и внутривидовых форм. Особенно выделяются узколистные опушенные груши из секции *Argyromalon* Fed., такие виды, как: *P. salicifolia*, *P. medvedevii*, *P. takhtajanii*. К этой же секции относится и описываемая нами груша.

Встречаясь в изолированных друг от друга нишах, преимущественно в горной степи, среди скальной растительности и реже в лесах и даже полупустынях, в весьма пестрых почвенно-климатических фитогеографических, преимущественно аридных условиях, эти груши, наряду с родами *Crataegus*, *Astragalus* и др., находятся в периоде бурного видообразования.

Дикорастущие груши, особенно перечисленные выше, выпали из поля зрения специалистов народного хозяйства, хотя и заслуживают большего внимания как прекрасный материал для селекционных целей, так и в силу высокой своей декоративности.

Ботанический институт
Академии наук Армянской ССР

2. Ի. ՄՈՒԼՔԻԶԱՆՅԱՆ

Տափնեղ *Pyrus theodorovii* Mulk. Երևան

Հողվածում նկարագրվում է տանձինու նոր տեսակ Հայկական ՍՍՌ-ից:

Տանձենին ոչ մեծ, 5—7մ բարձրություն ունեցող շուգեղ ճյուղերով, սակավաթիվ փշեր կրող ծառ է։ Տերևները էլիպսաձև, ոչ մեծ 3—5 (7) սմ երկարության 1,2—1,8 սմ լայնության, վերե-
վում կլորավուն փոքրիկ բծիկով, հազվադեպ սրածայր, երկու կողմից խիտ սպիտակ արծաթա-
գույն թավով, 1,5—2 սմ երկար կոթերով։ Ծաղիկները սպիտակ, պտուղը համարյա գնդաձև, թե-
թևակի երկարավուն 2—3 սմ, բավականին հաստ, 1 սմ երկարություն ունեցող պտղակոթի վրա։

Նկարագրվել է Վեդու շրջանի Գելախոր գյուղի շրջակայքից, լեռնա-տափառտանային գո-
տուց: Աճում է 1500—1600 մ բարձրության վրա ծովի մակերևույթից: Հայտնաբերված է Հ. Ի.
Մուխրյանյանի կողմից 1964 թ.:

Բարձր դեկորատիվ արժողութուն ունեցող ծառ է։ Աչքի է ընկնում իր արծաթափայլ տերևներով և շորադիմացկանությամբ։ Կարելի է հանձնարարել լայն օգտագործման կանաչ շինարարության, ինչպես նաև սելեկցիոն նպատակների համար։